herpy

GEKKOER

Cat gecko

Aeluroscalabotes felinus

Aeluroscalabotes felinus er en sky, rødbrun klatrer fra de fugtige skove i Sydøstasien, som færdes i grenene om natten og sover sammenrullet med halen om kroppen. Den er den eneste art i sin slægt, skal have det køligt og fugtigt og er svær at holde, så den passer til den erfarne holder.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Pentadactylus felinus; Aelurosaurus felinus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**65-90 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-75 dage** ved 24-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. I Thailand er indsamling og eksport forbudt, så køb kun opdrættede dyr. Tjek altid den aktuelle lovgivning, inden du anskaffer dyret.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyrene enkeltvis, i et terrarie af glas eller plast. Et voksent dyr kan klare sig i et lille terrarie på cirka 40 liter.
TEMPERATUR	Temperaturen skal ligge mellem 18 og 28 °C. Et rimeligt skøn er derfor 20-26 °C om dagen og 18-22 °C om natten, men de nøjagtige tal er ikke undersøgt grundigt. Der angives ikke noget hotspot, og arten tåler ikke varme.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Fugtighed er afgørende. Daglig sprøjtning er ufravigelig, for dyrene får mange helbredsproblemer, hvis fugtigheden er for lav. Luftfugtigheden skal ligge omkring 65-82 %, og kortvarigt op til 90 %.
LYS OG UVB	Der findes ingen dokumenterede anbefalinger om UVB til *Aeluroscalabotes felinus*. Den er udelukkende nataktiv og sover i skjul om dagen, så UVB-behovet er sandsynligvis lavt, men det er ikke undersøgt.
FODER	*Aeluroscalabotes felinus* lever af små insekter og andre leddyr. Fodr hver anden dag i meget små mængder, to til fire små byttedyr pr. dyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Aeluroscalabotes felinus* er sky, tilbagetrukken og stressfølsom, og den er ikke et dyr, man skal håndtere. Hold den enkeltvis. Parhold er kun til avl og bør først prøves, når dyrene er faldet til efter fire til seks uger.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Malaysia, Indonesien, Thailand, Singapore og Brunei.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/aeluroscalabotes-felinus