herpy

GEKKOER

Marbled leaf-toed gecko

Afrogecko porphyreus

En lille, flad og marmoreret gekko fra Sydafrikas sydlige og sydvestlige kyst, der lever i klippesprækker og under bark og om aftenen jager insekter ved lamper og husmure. Pasningen er næsten ikke beskrevet, så vejledningen bygger på det milde middelhavsklima, arten kommer fra.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Phyllodactylus porphyreus; Gecko porphyreus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**45-60 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Afrogecko porphyreus*, og arten holdes næppe i stort omfang. Vejledningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet, levestedet og artens størrelse.

TEMPERATUR

Temperaturerne følger klimaet i udbredelsesområdet. Om sommeren skal der være 22-26 °C om dagen og 14-18 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Klimaet har moderat luftfugtighed, med mest regn om vinteren. Luftfugtigheden i terrariet skal ligge omkring 40-60 %.

LYS OG UVB

Arten er aktiv i skumringen og om natten, og der findes ingen oplysninger om UVB-behov. Et svagt UVB-lys til skyggedyr (Ferguson-zone 1) kan bruges som tilskud, men det er valgfrit, hvis foderet tilsættes kalk med D3-vitamin.

FODER

Arten lever af en række små leddyr. Giv fårekyllinger, små græshopper, små kakerlakker og en gang imellem voksmøllarver. Foderdyrene må ikke være længere end afstanden mellem dyrets øjne. Voksne dyr fodres 2-3 gange om ugen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Afrogecko porphyreus er social og ikke territorial. Flere dyr deler ofte et skjul, og hunnerne lægger deres æg sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sydafrika.