herpy

GEKKOER

Even-fingered gecko

Alsophylax pipiens

Alsophylax pipiens er en lille, natlig gekko fra Centralasiens ørkener og stepper, hvor somrene er varme og vintrene kolde. Den bliver 7-9 cm lang med hale, ligger i vinterhvile fra efteråret til foråret, og hannerne kan give en fløjtende lyd fra sig. Pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Lacerta pipiens; Alsophylax microtis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**40-60 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Alsophylax pipiens*. Klimaet i udbredelsesområdet er tørt og kontinentalt med varme somre og kolde vintre, og arten lever i sprækker i ler, kalk og sten.

TEMPERATUR
Lav en gradient. Om dagen holdes terrariet på 25-28 °C med et varmested på 30-35 °C under en lampe styret af en termostat. Om natten falder temperaturen til 15-20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luften skal være tør, omkring 30-40 %. Giv en meget lav skål med frisk vand, som skiftes jævnligt, og læg et par sten i, så små dyr ikke kan drukne. Sprøjt en del af indretningen let en gang om ugen, og lad den tørre op igen.

LYS OG UVB
Alsophylax pipiens er aktiv om natten, så UVB er ikke nødvendigt, når foderdyrene pudres med kalk og D3-vitamin. Et svagt UVB-rør kan bruges, hvis der er skygge og skjul nok.

FODER
Arten lever af små leddyr. Giv små foderdyr: springhaler, bananfluer, små fårekyllinger og nyklækkede kakerlakker. Byttet må ikke være bredere end afstanden mellem dyrets øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Alsophylax pipiens er et lille, sky og hurtigt dyr, der ikke egner sig til håndtering. Halen kan knække af, hvis man griber om den. Dyret er mest aktivt efter mørkets frembrud, og hannerne kan høres fløjte.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mongoliet, Rusland, Kasakhstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Kina.