herpy

GEKKOER

Zigzag velvet gecko

Amalosia rhombifer

Amalosia rhombifer er en lille, nataktiv gekko fra det nordlige Australien med en lys, takket zigzagtegning langs ryggen. Den lever på træer i åben skov og savanne og gemmer sig om dagen under løs bark. Der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på levestedet og på beslægtede arter.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Oedura rhombifer* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**3-5**
Inkubation	**60-65 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Australien tillader ikke udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Amalosia rhombifer*.
TEMPERATUR	Om dagen holdes terrariet på 24-28 °C, og under en varmekilde i den ene ende kan der være 30-33 °C, så dyret selv kan vælge. Om natten må temperaturen falde til 18-22 °C. Tallene er lånt fra beslægtede *Oedura*-arter.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være moderat: 40-60 %. Sprøjt den ene halvdel af terrariet let hver anden til tredje dag, så bark og bund tørrer op igen i løbet af et døgn. Om sommeren, i regntiden, kan der sprøjtes lidt mere.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kræver ikke UVB, men et svagt UVB-rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1) over den ene side af terrariet giver en sikrere kalkomsætning og skader ikke, når der er rigeligt med skygge.
FODER	Gekkoen æder insekter og andre små leddyr: fårekyllinger, græshopper, små kakerlakker, møl og små melorme. Byttet skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne. Voksne dyr fodres 2-3 gange om ugen og ungdyr 3-4 gange om ugen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Amalosia rhombifer* er sky og hurtig og skal ikke håndteres mere end nødvendigt. Den kan smide halen, når den føler sig truet, og halen vokser ud i en anden form. Hold den aldrig i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.