herpy

GEKKOER

## Forest bavayia

# *Bavayia cyclura*

*Bavayia cyclura* er en lille, nataktiv gekko fra skovene på Ny Kaledonien, hvor den om dagen skjuler sig under bark og i hulrum i træerne. Den holdes næppe i terrarier, og der findes kun lidt viden om pasningen. Arten er truet i naturen.

Familie: Diplodactylidae  Tidligere navn: *Peripia cyclura; Lepidodactylus cyclurus*  Udgivet 16. november 2026

**SPECIFIKATIONER**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **7 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Tørskov og regnskov** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **22-26 °C** |
| Temperatur, nat | **18-21 °C** |
| Luftfugtighed | **60-80 %** |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **12-18 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **2 æg** |
| Inkubation | **60-120 dage**<br>ved 22-25 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Truet (EN)** |

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

## Om arten

*Bavayia cyclura* er en lille gekko i familien Diplodactylidae. Den bliver op til 72 mm fra snude til kloak, og halen er omtrent lige så lang som kroppen, så det samlede mål er op til omkring 15 cm. Skællene er fine og kornede uden knuder, og farverne er dæmpede. Tæerne er udvidede med klæbelameller og har alle kløer.

Arten blev beskrevet af Albert Günther i 1872 som *Peripia cyclura* og er typeart for slægten *Bavayia*. Artsnavnet kommer af græsk kyklos (rund) og oura (hale), fordi halen er rund i tværsnit, mens den er mere fladtrykt hos andre arter i slægten. Slægten blev revideret i 2022, og antallet af arter steg til 41. Ældre angivelser om *B. cyclura* kan derfor omfatte dyr, der i dag hører til andre arter. Den ligner *Bavayia crassicollis* meget.

*B. cyclura* er nataktiv og sky og er et dyr at iagttage.

## Udbredelse og levested

*Bavayia cyclura* findes kun på Ny Kaledonien, på hovedøen Grande Terre og på Île des Pins med de nærmeste småøer. Ældre angivelser nævner også Loyalty-øerne, men den forekomst er usikker efter revisionen af slægten.

Kortet er centreret på midten af Grande Terre, og rammen dækker hovedøen og Île des Pins.

**Oprindelig udbredelse:** Ny Kaledonien.

### LEVESTED

*Bavayia cyclura* lever i skov på Ny Kaledonien og holder til i træerne. Om dagen gemmer slægtens arter sig under bark, i hulrum i træer og under sten.

Klimaet er tropisk med en varm og fugtig årstid fra omkring november til marts, hvor temperaturen ligger på 27-30 °C, og en køligere og tørrere årstid fra omkring juni til august med 20-23 °C. Årsmiddeltemperaturen er 23 °C, og luftfugtigheden kan nå op omkring 80 %, selv om passatvinden dæmper den. Nedbøren varierer meget fra den tørre vestkyst til de fugtige områder mod øst. Gekkoen er nataktiv og lever af hvirvelløse dyr.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

## Pasning

### TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Bavayia cyclura*, og arten holdes næppe. Anbefalingerne bygger på klimaet og levestedet på Ny Kaledonien og på bedre kendte gekkoer fra samme øgruppe: tallene er lånt fra *Eurydactylodes agricolae* og *Correlophus ciliatus*.

Et enkelt dyr eller et par skal have et højt terrarie på mindst 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde). Højden er vigtigere end bundarealet, fordi gekkoen klatrer på bark og grene. Indret med skråtstillede grene og korkbark, der giver sprækker at gemme sig i, samt levende planter med brede blade som pothos og bromelier. Bunden kan være fugtig jord uden gødning blandet med kokosmuld og dækket af visne blade, gerne som bioaktiv bund med springhaler og bænkebidere.

Terrariet skal have netventilation, så luften skifter, og dråberne tørrer op i løbet af dagen.

Læs mere: Terrarieopbygning og bioaktiv bund Læs mere: Foderdyr: hold og avl

### TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen i terrariet til *Bavayia cyclura* ligge på 22-26 °C og om natten på 18-21 °C. Der er ikke brug for en varm solplads, fordi arten er nataktiv og skjuler sig i dagtimerne. Hold temperaturen under 28 °C; årsmiddeltemperaturen på Ny Kaledonien er 23 °C.

Mål med et digitalt termometer midt i terrariet og i toppen. Sidder dyret med åben mund eller er sløvt, er der for varmt.

Læs mere: Varme og temperatur

### LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet til *Bavayia cyclura* skal ligge på 60-80 %, med en tydelig stigning om natten. Sprøjt terrariet sidst på eftermiddagen, så blade og grene er dækket af dråber, når gekkoen vågner. Dråberne er dens vigtigste drikkevand, og en lav skål med frisk vand kan stå fremme som supplement.

Fugten skal veksle med optørring i løbet af dagen. Er der stadig dråber på ruderne næste eftermiddag, er der for lidt luftskifte, eller der sprøjtes for meget.

### LYS OG UVB

*Bavayia cyclura* er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. Et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 over en del af terrariet er en fordel, men ikke nødvendigt, når foderet pudres med kalk og D3. Behovet er ikke dokumenteret for arten. Hold dagslængden på omkring 12 timer med mørke om natten, og sørg for skygge og skjul hele dagen.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

### FODER

*Bavayia cyclura* lever af hvirvelløse dyr. Giv små levende insekter som bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og små kakerlaknymfer, pudret med kalk med D3. Insekterne må ikke være bredere end afstanden mellem dyrets øjne. Om arten tager frugt eller færdigfoder til frugtædende gekkoer, er ikke dokumenteret.

Unger får foder dagligt og voksne to-tre gange om ugen. Fjern insekter, der ikke er spist, så de ikke generer gekkoen. Justér mængden efter dyrets kropsform, så det hverken bliver tyndt eller fedt.

### ADFÆRD OG HÅNDTERING

*Bavayia cyclura* er sky og nataktiv, og dens tynde hud og lette hale gør den uegnet til håndtering. Tag den ikke op. Er det nødvendigt at flytte den, så lok den ind i en beholder. Halen smides let og vokser ikke ud igen i samme form.

Hvordan arten tåler selskab, er ikke dokumenteret. Hold dyrene enkeltvis eller som et par i et større terrarie med mange skjul, og skil dem, hvis den ene bliver jagtet eller taber sig.

## Avl

### KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannerne hos *Bavayia cyclura* har præanale porer på undersiden foran kloakken; i slægten er der 7-46 porer i en til fire rækker. Alder og størrelse ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret. Hos lignende nykaledonske gekkoer ligger kønsmodenheden på 12-18 måneder.

### PARRING

Parringsrytmen hos *Bavayia cyclura* er ikke dokumenteret. En kølig periode på nogle uger med lidt kortere dage og køligere nætter svarer til den kølige årstid på Ny Kaledonien og kan gøre hunnerne mere villige. Parringen sker af sig selv, når et par sættes sammen. Jagter hannen hunnen konstant, så skil dem.

### ÆGLÆGNING OG KULD

*Bavayia cyclura* lægger to æg ad gangen. Antallet af kuld om året er ikke dokumenteret. Hunnen lægger æggene i hulrum, under bark eller i bladhjørner, så sørg for flere egnede steder. Æggene klæber sig ofte fast, så løsn dem ikke med magt.

Giv hunnen ekstra kalk i hele sæsonen, og tjek æglæggestederne jævnligt.

### INKUBATION

Fastlimede æg inkuberes, hvor de sidder. Løse æg flyttes forsigtigt til en lille, ventileret boks med let fugtigt underlag uden at blive vendt. Ved 22-25 °C klækker æggene hos *Eurydactylodes agricolae* efter 60-120 dage; for *Bavayia cyclura* er inkubationen ikke dokumenteret.

### OPDRÆT AF UNGER

Ungerne af *Bavayia cyclura* er små og sarte. Hold dem adskilt fra de voksne i en lille faunaboks med netventilation, et skjul og et stykke bark, og sprøjt dagligt. Giv bananfluer og små fårekyllinger pudret med kalk fra de første dage. Vækstraten er ikke dokumenteret.

## Sundhed og typiske fejl

Der er ingen dokumenterede sygdomme hos *Bavayia cyclura* i fangenskab, så rådene bygger på erfaringer med lignende gekkoer. De typiske problemer er:

- For lidt kalk og D3, som giver bløde kæber og krumme lemmer.
- For meget varme: længere tid over 28 °C stresser dyret og kan være livsfarligt.
- Stillestående, mættet luft og mug, som giver hudinfektioner.
- Tabt hale, som skyldes stress eller forkert håndtering.

Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis gekkoen er sløv, taber sig eller holder op med at spise.

### Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.