herpy

GEKKOER

Blaesodactylus boivini

En stor, træklatrende gekko fra det nordlige Madagaskar med blød, fløjlsagtig hud. Den regnes for nataktiv, men sidder ofte fremme og soler sig om dagen og trives i et tørt, luftigt terrarie. Den er sjælden i terrarier, og erfaringerne med den er få.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Platydactylus boivini; Homopholis boivini* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**45-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**120-180 dage** ved 25-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten er ikke opført under CITES og står ikke på nogen af bilagene i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder. IUCN opfører arten som sårbar, og i handlen er dyr fra opdræt at foretrække.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). To dyr kan holdes i omkring 60 × 60 × 90 cm og tre i omkring 90 × 90 × 120 cm.

TEMPERATUR
Blaesodactylus boivini holdes ved almindelig stuetemperatur med et varmt sted højt oppe på en korkafsats på omkring 32 °C. Her soler dyret sig, og afsatsen bliver brugt flittigt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden ligger det meste af døgnet på 45-55 %, svarende til almindelig stueluft, og stiger kortvarigt, når terrariet sprøjtes.

LYS OG UVB
Fordi dyrene sidder fremme og soler sig om dagen, skal de have UVB-lys. Et UVB-rør til skyggedyr eller moderat sol (Ferguson-zone 2) over den ene side af terrariet, så dyret kan vælge at sidde i skyggen, passer til den adfærd.

FODER
Færdigfoder til frugtædende gekkoer, rørt op med vand til en tyk grød, er grundfoderet, og dyrene tager det gerne. Server det i en lille skål højt oppe i terrariet, og fjern rester efter et døgn.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Blaesodactylus boivini er en stor og rolig gekko, men den er ikke beregnet til daglig håndtering. Dyrene sidder ofte åbent fremme, også i dagtimerne. Det tryggeste er at holde hvert dyr for sig.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.