herpy

GEKKOER

Chameleon gecko

Carphodactylus laevis

Carphodactylus laevis er en slank, nataktiv gekko fra regnskovene i det nordøstlige Queensland. Den har lange, tynde ben, kløer på tæerne, en kam langs ryggen og en gulerodsformet hale og er helt anderledes bygget end de fleste gekkoer. Opdrættede dyr er hårdføre og yngler villigt, men arten er stadig sjælden i fangenskab.

Familie: Carphodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 35 × 70 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Temperatur, nat	**16-22 °C**
Luftfugtighed	**75-100 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**4-6**
Inkubation	**90-133 dage** ved 21-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Carphodactylus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Carphodactylus laevis skal have et højt terrarie, som giver dyrene plads til at gå af vejen for hinanden. Et par kan holdes i mindst 50 × 35 × 70 cm (længde × bredde × højde), og mere er bedre, hvis der er flere dyr.

TEMPERATUR

Carphodactylus laevis har lave krav til varme. Om dagen skal terrariet ligge på 22-28 °C, og om natten falder temperaturen 5-6 grader, til omkring 16-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden er afgørende for *Carphodactylus laevis* og skal hele tiden ligge på 75-100 %. Sprøjt terrariet grundigt med lunkent vand dagligt eller mindst 2-5 gange om ugen, oftere i varmt og tørt vejr.

LYS OG UVB

Carphodactylus laevis er nataktiv og lever skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendigt. Dagslys fra et vindue i nærheden er nok; ellers et svagt LED-lys eller lysstofrør.

FODER

Carphodactylus laevis er ikke kræsen, når den først har vænnet sig til fangenskab. Fårekyllinger kan være næsten hele kosten, gerne suppleret med kakerlakker. Fodr 2-3 gange om ugen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Carphodactylus laevis er stille og skjult om dagen og bliver aktiv få minutter efter mørkets frembrud. Den sætter sig så på en gren eller et stykke bark og bliver ofte siddende i timevis.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.