herpy

GEKKOER

Bibron's thick-toed gecko

Chondrodactylus bibronii

En kraftig, nataktiv klippegekko fra Karoo og de tørre egne i det sydlige Afrika, med tykke tæer, knudret hud og mørke tværbånd. Den er robust og nem at holde, men sælges ofte under forkert navn: Mange dyr i handlen er i virkeligheden den nærtstående *Chondrodactylus turneri*.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Pachydactylus bibronii; Pachydactylus bibroni; Tarentola bibronii* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**19-23 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-6**
Inkubation	**45-60 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Spørg sælgeren, hvilken art dyret faktisk er, og om det er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Til ét voksent dyr eller et par er 60 × 40 × 40 cm (længde × bredde × højde) en god størrelse, og større er bedre. Ét dyr kan klare sig i 50 × 25 × 30 cm, men et rummeligere terrarie passer bedre til dyrets størrelse og territoriale levevis.

TEMPERATUR
Arten klarer sig ved almindelig varme, når blot en del af terrariet er varmere end resten. Hold 24-28 °C om dagen med et varmt hjørne på 30-33 °C, og lad temperaturen falde til 19-23 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten hører til i tørre egne, og terrariet skal være tørt og luftigt med en luftfugtighed på omkring 30-50 %. Sprøjt dagligt med lidt vand, så dyret kan slikke dråberne af sten og ruder, og lad det tørre op igen i løbet af dagen.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og har ikke brug for UVB, når insekterne pudres med kalk og D3-vitamin, men mange dyr i fangenskab soler sig gerne under et svagt lys.

FODER
Gekkoen er insektæder og tager næsten alt, hvad den kan overmande. Fårekyllinger og melorme er det klassiske grundfoder, suppleret med græshopper, dubia-kakerlakker og en sjælden gang voksmøllarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er territorial, og voksne hanner slås, ofte så de mister tæer eller stykker af huden. Hanner må derfor aldrig holdes sammen. En han kan gå med to-tre hunner, hvis terrariet er stort og har mange skjul.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Sydafrika, Namibia og Botswana.