herpy

GEKKOER

Chondrodactylus fitzsimonsi

Chondrodactylus fitzsimonsi er en kraftig, nataktiv klippegekko fra de tørre egne i Namibia og det sydvestlige Angola, med olivenfarvet ryg, mørke tværbånd og brede klæbelameller under tæerne. Der findes næsten ingen pasningsviden om arten, men de nære slægtninge holdes ofte og giver et godt billede af kravene.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Pachydactylus fitzsimonsi; Pachydactylus laevigatus fitzsimonsi; Pachydactylus laevigatus tesselatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken, savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-60 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Chondrodactylus fitzsimonsi*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 25-28 °C, og under en spotlampe skal en sten kunne nå 32-35 °C, så dyret selv kan vælge mellem varmt og køligt. Om natten skal temperaturen falde til 18-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør, omkring 30-50 %, som i udbredelsesområdet. Forstøv lunkent vand på en del af terrariet sent om aftenen, så dyret kan slikke dråberne, og lad bunden tørre op igen i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og sover i sprækkerne om dagen, så den har ikke brug for kraftigt lys. Hav 12 timers dag og helt mørkt om natten, styret af et tænd-sluk-ur. UVB er valgfrit.
FODER	Dyret spiser levende insekter: fårekyllinger, kakerlakker, græshopper og melorme. Voksne dyr får foder 2-3 gange om ugen, unge dyr oftere. Insekterne må ikke være større end hovedets bredde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Adfærden hos *Chondrodactylus fitzsimonsi* i fangenskab er ikke dokumenteret. Slægtningene er sky, hurtige og uberegnelige, så arten egner sig til at se på og ikke til håndtering. Hold dyrene enkeltvis eller som par.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Namibia og Angola.