herpy

GEKKOER

Turner's thick-toed gecko

Chondrodactylus turneri

Chondrodactylus turneri er en kraftig, nataktiv gekko fra savanne og klippeland i det sydlige og østlige Afrika, med store orange øjne, brune bånd og klæbelameller under tæerne. Den er nem at holde, men sky og hurtig, så den egner sig bedst til den, der vil se på sit dyr og ikke tage det op.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**33-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-60 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten er tidligere blevet forvekslet med flere slægtninge, så spørg sælgeren, hvilken art dyret faktisk er, og om det er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par kan holdes i et terrarie på 60 × 40 × 40 cm (længde × bredde × højde) eller 80 × 40 × 40 cm. Selv 60 × 30 × 30 cm kan gå, men mere plads giver bedre mulighed for at skabe både varme og kølige zoner.

TEMPERATUR

Hold 25-28 °C om dagen, og lav et varmt sted, fx en sten under en spotlampe, hvor temperaturen må nå op mod 35 °C. Dyrene sætter sig gerne på den opvarmede sten, når lyset bliver slukket, og tager varmen derfra.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Chondrodactylus turneri lever på tørre klipper og i savanne, så luften skal holdes forholdsvis tør, omkring 30-50 %, som hos slægtningene *Chondrodactylus bibronii* og *Chondrodactylus angulifer*.

LYS OG UVB

Chondrodactylus turneri er nataktiv og sover i sprækkerne om dagen, så den har ikke brug for kraftigt lys. Hav et ur til at tænde og slukke lyset, så der er omkring 12 timers dag og helt mørkt om natten.

FODER

Chondrodactylus turneri har god appetit og er ikke kræsen. Den spiser fårekyllinger, kakerlakker, melorme, møl og græshopper. Fårekyllinger og kakerlakker er godt grundfoder, mens møl og græshopper om sommeren er en yndet godbid.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Chondrodactylus turneri er ikke et dyr til håndtering. Den kan være vild og uberegnelig. En dag solbader den roligt på en sten, og en anden dag stikker den af i panik, så snart nogen kommer i nærheden.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sydafrika, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Eswatini, Tanzania, Malawi og Zambia.