herpy

GEKKOER

Texas banded gecko

Coleonyx brevis

Coleonyx brevis er en lille, skrøbelig ørkengekko fra Chihuahuaørkenen i det sydvestlige USA og det nordlige Mexico. Den er båndet, har bevægelige øjenlåg, mangler hæftelameller under tæerne og er aktiv i skumringen og om natten. Pasningen minder om en lille udgave af *Eublepharis macularius*, men arten tåler meget lidt håndtering.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Coleonyx variegatus brevis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**1,9-3,3 g**
Levetid	**15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**60 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-bilagene og ikke på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-dokumenter. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Tag aldrig dyr ud af naturen; køb opdrættede dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et enkelt dyr skal have et terrarie på mindst 75 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde), svarende til et 75 liters akvarium af den lange type. Større er altid bedre.

TEMPERATUR
Giv en temperaturgradient. På den varme side skal der være et skjul på 32-35 °C, og resten af terrariet holdes på 22-29 °C. Om natten må temperaturen falde til 18-22 °C, men ikke lavere. Varmekilderne slukkes om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra et tørt klima og trives ved en gennemsnitlig luftfugtighed på 30-40 %, målt midt i terrariet med et digitalt hygrometer.

LYS OG UVB
Coleonyx brevis er nataktiv og kan i princippet overleve uden UVB, hvis den får D3-vitamin med foderet. Dyrene er dog sundere med et svagt UVB-lys, som også giver en tydelig dag og nat.

FODER
Coleonyx brevis æder insekter og andre små leddyr. I naturen er den ikke specialiseret og tager det meste, den støder på.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er mild og bider ikke, men den er lille, hurtig og skrøbelig, og håndtering stresser den. Hold den til et minimum. Fodring med en blød pincet er en god måde at komme tæt på uden at tage dyret op. Tag aldrig fat i halen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
USA og Mexico.