herpy

GEKKOER

Western banded gecko

Coleonyx variegatus

En lille, slank ørkengekko fra det sydvestlige USA og det nordvestlige Mexico, med silkeblød hud, bevægelige øjenlåg og bånd i gult og brunt. Den bliver kun 10-15 cm, svinger halen op over ryggen som en skorpion, når den jager, og har brug for et varmt, tørt terrarie med et enkelt fugtigt skjul.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Stenodactylus variegatus; Eublepharis variegatus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 25 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-34 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**40-50 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. I store dele af hjemlandet er det forbudt at indsamle og sælge vilde dyr, så køb kun dyr, der er opdrættet i fangenskab, og bed om dokumentation for oprindelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Arten holder sig for det meste på jorden, så bundarealet betyder mere end højden. Omkring 30 × 30 cm er det mindste, der giver et par mulighed for at vælge mellem varmt og køligt, tørt og fugtigt.
TEMPERATUR	Arten tåler store udsving, men har brug for en tydelig gradient, så den selv kan vælge. Hold 24-28 °C i terrariet om dagen og et varmt område på 30-34 °C. Begynd hellere ved 30-32 °C end ved den øvre grænse.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra egne med meget lidt regn og mister kun lidt vand gennem huden.
LYS OG UVB	Arten er strengt nataktiv og tilbringer dagen i skjul. UVB er ikke nødvendigt, når insekterne pudres med kalk og D3-vitamin, og til de ørkenlevende *Coleonyx*-arter frarådes det direkte.
FODER	Gekkoen lever af levende insekter. Mellemstore melorme kan være grundfoder, og fårekyllinger, voksmøllarver og små kakerlakker giver afveksling.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Gekkoen er sky og hurtig, især vildfangne dyr, og smider let halen, hvis den føler sig truet. Den er mest et dyr at iagttage. Om aftenen kommer den frem og jager med halen krummet op over ryggen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/coleonyx-variegatus