herpy

GEKKOER

Belep giant gecko

Correlophus belepensis

Correlophus belepensis er en stor, sjælden gekko, der kun lever på en enkelt lille ø i Belep-øerne nordvest for Grande Terre på Ny Kaledonien. Den ligner den nære slægtning *Correlophus ciliatus* og har en tydelig kam af pigge fra øjet ned mod skulderen. Arten er kritisk truet i naturen, og der findes næsten ingen viden om pasning i fangenskab.

Familie: Diplodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Om arten

Correlophus belepensis er en stor gekko af familien Diplodactylidae. Kroppen bliver op til 10 cm fra snude til kloak. Den samlede længde og vægten er ikke dokumenteret; tallet i faktaboksen er et skøn ud fra kroppen. Arten adskiller sig fra *C. sarasinorum* ved en tydelig kam af takkede skæl, der løber fra bagved øjet til skulderen. Fra den nærmeste slægtning, *Correlophus ciliatus*, kendes den på en jævn skæltegning langs siderne og, hos tre af de fire første kendte dyr, en række små, hvidlige knopper på nedre ryg eller halerod.

Arten blev beskrevet i 2012 af Aaron Bauer, Anthony Whitaker, Ross Sadlier og Todd Jackman i den revision af Ny Kaledoniens kæmpegekkoer, der flyttede *C. ciliatus* og *Correlophus sarasinorum* til slægten *Correlophus*. Artsnavnet henviser til Belep-øerne, hvor den lever.

Udbredelse og levested

Correlophus belepensis findes kun på Belep-øerne, der hører til Ny Kaledonien og ligger mere end 40 km nordvest for Grande Terre. Arten er kun kendt fra øen Art, og typelokaliteten ligger omkring 2 km øst for Waala i 230 meters højde. Det kendte levested er meget lille, og arten er ikke fundet andre steder.

Den snævre udbredelse er hovedårsagen til, at arten er kritisk truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Ny Kaledonien.

LEVESTED

Correlophus belepensis lever i lukket skov og skovlignende krat på hård, lateritisk jord. Der findes ingen målinger af temperatur og luftfugtighed fra levestedet.

Arten trues af tab af levested, af den invasive myre *Wasmannia auropunctata* og af indsamling til handel.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

Pasning

TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Correlophus belepensis*. Tallene i vejledningen er lånt fra de nære slægtninge *Correlophus ciliatus* og *Correlophus sarasinorum*, der lever på Grande Terre og er bedre kendte i fangenskab.

Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Arten er stor og træboende, så højden tæller mere end bundarealet. Indret med tykke grene i skrå og vandrette lag, korkrør og stykker af korkbark som sovepladser og planter med store blade, så der er mørke og skjulte steder. Bunden kan være en fugtig blanding af kokosmuld, jord uden gødning og lidt sphagnum med et lag blade ovenpå. Undgå fint sand, som dyret kan sluge. Terrariet skal have god ventilation.

TEMPERATUR

Om dagen er 22-26 °C passende for *Correlophus belepensis*, og et lille område øverst må gerne nå 26-28 °C. Om natten må temperaturen falde til 18-21 °C.

For meget varme er en større risiko end kulde. Undgå, at temperaturen i længere tid kommer over 28 °C, og stil terrariet væk fra solvendte vinduer. I de fleste danske hjem er ekstra varme kun nødvendig om vinteren, og en svag varmepære eller en varmemåtte på siden, styret af en termostat, er nok. Mål med et digitalt termometer både højt og lavt.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet til *Correlophus belepensis* skal svinge: fugtige nætter og tørrere dage. Sprøjt terrariet grundigt om aftenen, så fugtigheden stiger til 70-80 %, og lad den falde til 50-60 % i løbet af dagen. Konstant våde forhold giver mug og hudproblemer.

Dyret drikker dråber fra blade og ruder, men en lav skål med frisk vand kan stå fremme og skiftes dagligt. Et hygrometer viser, om rytmen holder.

LYS OG UVB

Correlophus belepensis er skumrings- og nataktiv og sover gemt om dagen. Det er ikke dokumenteret, hvor meget UVB den behøver. Et svagt UVB-lys til skyggedyr (Ferguson-zone 1) er en fordel, fx et T5-rør på 5-7 % i den ene side af terrariet, så der altid er skygge i resten. UV-indekset ved de øverste grene skal ikke være over 1-2.

Hav lyset tændt 11-12 timer om dagen, gerne på et tænd-sluk-ur, og sørg for, at der er helt mørkt om natten. Brug ikke stærke spotlamper.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Kosten i naturen er ikke dokumenteret for *Correlophus belepensis*. Den nære slægtning *Correlophus ciliatus* lever af frugt og insekter, og foderet følger den. Grundfoderet er en færdigblandet pulverkost til frugtædende gekkoer, rørt op med vand til en tyk grød. Server en lille skål to til tre gange om ugen til voksne dyr og oftere til unge, og tag rester ud efter et døgn. Skålen skal sidde højt oppe.

Giv desuden levende insekter en til to gange om ugen: fårekyllinger, græshopper eller kakerlakker. De skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne og pudres med kalk med D3-vitamin. Frisk, moden frugt kan gives som godbid, men skal ikke være hovedfoderet.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Der findes ingen beskrivelser af temperamentet hos *Correlophus belepensis* i fangenskab. Som andre skumringsaktive gekkoer bliver den sandsynligvis stresset af megen håndtering. Lad nye dyr falde til i flere uger, og vent med at tage dem op, til de spiser fast. Hold håndteringen kort og rolig tæt ved gulvet, og tag aldrig fat i halen, fordi den kan smides og ikke vokser ud igen.

Dyrene holdes bedst enkeltvis. Der findes ikke dokumenterede holdformer i grupper, og dyrene kan sandsynligvis slås, som andre kæmpegekkoer gør.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Der findes ingen tal for alder og vægt ved kønsmodenhed hos *Correlophus belepensis*. Hos *C. ciliatus* kan hannerne kendes på en bule ved halens rod efter nogle måneder, og hunnerne avles først, når de er fuldt udvoksede. Samme princip er fornuftigt her: vent, til hunnen er helt udvokset og i god foderstand.

PARRING

Parringssæsonen for *Correlophus belepensis* er ikke dokumenteret. Hos andre kæmpegekkoer fra Ny Kaledonien får hunnen en vinterpause med lidt lavere temperatur og kortere dage før parringen om foråret. Sæt hannen ind til hunnen i hendes terrarie, og hold øje med, at han ikke bliver for voldsom. Skil dyrene, hvis der kommer skrammer eller uro.

ÆGLÆGNING OG KULD

Correlophus belepensis er æglæggende. Antallet af æg pr. lægning og antallet af lægninger pr. år er ikke dokumenteret. Slægtninge lægger normalt et eller to æg ad gangen, og tallet i faktaboksen er lånt derfra. Stil en æglæggekasse med fugtig sphagnum eller kokosmuld i terrariet, fx en plastboks med et hul i låget. Ellers graver hunnen æggene ned i bunden.

Giv hunnen rigeligt med kalk og insekter i sæsonen, og hold øje med, at hun ikke taber sig.

INKUBATION

Inkubationen er ikke dokumenteret for *Correlophus belepensis*. Tallene på 60-120 dage ved 22-26 °C er lånt fra *Correlophus ciliatus*. Flyt æggene forsigtigt til en lille boks med fugtigt substrat som vermiculite eller perlite uden at vende dem. Boksen skal have et par små lufthuller. Temperaturen må aldrig komme over omkring 28 °C.

Hold substratet fugtigt, men ikke vådt, og lad æg, der ser tvivlsomme ud, ligge, til de tydeligt er døde.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af unger er ikke beskrevet for *Correlophus belepensis*. Hos nærtbeslægtede arter får ungerne en lille faunaboks med køkkenrulle eller sphagnum, en kvist og et skjul og sprøjtes dagligt. De lever af blommen i de første dage, og derefter får de pulverkost samt små insekter pudret med kalk med D3-vitamin. Hold ungerne enkeltvis, og vej dem jævnligt. Fremgangsmåden er lånt fra slægtningen.

Sundhed og typiske fejl

Der er ikke beskrevet særlige sygdomme hos *Correlophus belepensis*. Ud fra erfaringerne med slægtningene er de typiske problemer:

- For meget varme. Længere tid over 28 °C stresser gekkoer fra de nykaledonske skove.
- For lidt kalk og D3-vitamin, som giver bløde knogler, krumme lemmer og rystelser, især hos unge dyr og avlshunner. Brug en god færdigkost og pudr insekterne.
- Konstant våd bund og dårlig ventilation, som giver mug, svamp og hudproblemer.
- Hudrester, der sidder fast på tæer og halespids. Giv et fugtigt skjul, og løsn resterne forsigtigt med lunkent vand.
- Tabte haler efter håndtering eller slagsmål. Det er ikke farligt, men halen vokser ikke ud igen.

Et sundt dyr har klare øjne, en fyldig halerod og et godt greb. Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig, ikke spiser i flere uger eller ser slap ud.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.