herpy

GEKKOER

Kranset øjenvippegekko

Correlophus ciliatus

En nysgerrig, nataktiv klatrer fra regnskovene på Ny Kaledonien, med frynsede kamme over øjnene og klæbefødder, der kan gå op ad glas. Den tåler stuetemperatur, lever af færdigfoder og insekter og er et af de bedste valg til den, der vil have sit første krybdyr.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Crested gecko Tidligere navn: *Rhacodactylus ciliatus* Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**35-55 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**15-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**5-9**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag D**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på bilag D i EU's forordning om handel med vilde dyr. Der kræves ingen tilladelser ved køb og salg inden for EU, men dyr, der indføres fra lande uden for EU, skal anmeldes ved grænsen. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. I Ny Kaledonien er arten fredet, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde), og større er altid bedre. Et par eller en lille gruppe skal have mindst 60 × 45 × 90 cm.

TEMPERATUR
Correlophus ciliatus er glad for almindelig stuetemperatur. Om dagen skal der være 22-26 °C i terrariet, og et lille område øverst må gerne nå 26-28 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal svinge, som den gør i regnskoven. Spray terrariet grundigt med lunkent vand om aftenen, så fugtigheden stiger til 70-80 % eller mere, og gerne let igen om morgenen.

LYS OG UVB
Arten er aktiv i skumringen og om natten og kan leve uden UVB, når den får tilskud af D3-vitamin gennem foderet.

FODER
Grundfoderet er en færdigblandet pulverkost til frugtædende gekkoer, som røres op med vand til en tyk grød.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Correlophus ciliatus er rolig og kan blive ret tam, men den er ikke et kæledyr, der skal håndteres hver dag. Mange dyr er springske, især som unge, og hopper fra hånd til hånd.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Ny Kaledonien.