herpy

GEKKOER

South-western clawless gecko

Crenadactylus ocellatus

En af Australiens allermindste gekkoer: højst 4 cm fra snude til kloak og helt uden kløer på tæerne. *Crenadactylus ocellatus* lever skjult under bark, nedfaldent træ og sten i det sydvestlige Australien. Der findes kun lidt viden om pasningen, og arten er næsten ukendt i terrarier uden for Australien.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus ocellatus; Diplodactylus bilineatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 20 × 20 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**55-75 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's handelsforordning, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Crenadactylus ocellatus*, og arten holdes næsten ikke uden for Australien.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-26 °C i terrariet, og et lille område i den ene ende må gerne nå 28-30 °C. Om natten må temperaturen falde til 14-18 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være lav til middel: 30-50 %. Terrariet skal være overvejende tørt, men det fugtige skjul holdes let fugtigt med sphagnum eller jord, så dyrene kan søge fugt, og hudskiftet forløber let.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og lever skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendigt. Et svagt UVB-lys til skyggedyr (Ferguson-zone 1) kan monteres over den ene halvdel af terrariet, men der skal altid være store skyggede områder og skjul.
FODER	Kosten i naturen er ikke dokumenteret. Til størrelsen passer små leddyr: springhaler, bananfluer, små termitter, nyklækkede fårekyllinger og små kakerlakker. Byttet må ikke være større end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Crenadactylus ocellatus* er hurtig, genert og svær at se, fordi den gemmer sig om dagen og er aktiv i mørke.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/crenadactylus-ocellatus