herpy

GEKKOER

Pegu bent-toed gecko

Cyrtodactylus peguensis

En nataktiv gekko fra Myanmar, Thailand og Vestmalaysia, kendt fra skovene ved Pegu. Der findes kun få pålidelige pasningsoplysninger om arten, så vejledningen bygger på erfaringer med andre arter i slægten og er et forsigtigt udgangspunkt.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Gymnodactylus peguensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**90-150 dage** ved 22-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført under CITES eller på et af bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg inden for EU. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder. Dyr i handlen er ofte vildfangne, og de oprindelige lande kan have egne regler om udførsel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Oplysningerne her er lånt fra beslægtede arter i slægten *Cyrtodactylus* og fra de generelle krav til nataktive, klatrende gekkoer fra fugtige egne, ikke fra *C. peguensis* selv.
TEMPERATUR	Der er ingen dokumenterede temperaturer for *Cyrtodactylus peguensis*.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten er sandsynligvis afhængig af høj luftfugtighed, men tallene er lånt fra slægtninge. *C. irianjayaensis* holdes ved 70-100 % og *C. elok* ved 70-85 %.
LYS OG UVB	Der er ingen dokumenteret viden om, hvor meget lys *Cyrtodactylus peguensis* kræver. Arten er nataktiv, og beslægtede arter klarer sig med svag belysning.
FODER	Arten er insektæder. Oplysningerne om foder er lånt fra slægtninge og er ikke dokumenteret for *Cyrtodactylus peguensis*. Giv fårekyllinger, dubia-kakerlakker og lignende insekter, der er mindre end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Slægten har ry for at være sky, hurtig og med tynd, sart hud, der let revner. Gribes den, kan den bide. Håndtering frarådes derfor, og et dyr skal altid have tid til at falde til efter en flytning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand og Malaysia.