herpy

GEKKOER

Pacific gecko

Dactylocnemis pacificus

En nervøs, hurtig og smukt tegnet natgekko fra den nordvestlige del af New Zealands Nordø, hvor den lever i krat, skov og på klippekyster. Den føder levende unger, bliver 14-18 cm lang og kan blive over 20 år gammel. Den trives i et køligt, tempereret klima.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Hoplodactylus pacificus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-25 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 100 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og nektar**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**270-360 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten *Dactylocnemis* står på CITES liste III (opført af New Zealand) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr, så handel og indførsel kræver dokumentation. Kontakt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du overvejer at anskaffe arten.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Dactylocnemis pacificus* er kun sparsomt beskrevet. Arten regnes for forholdsvis let at holde og avle, men der findes ingen dokumenterede temperaturer, så klimatallene bygger på udbredelsesområdet.
TEMPERATUR	Temperaturerne er ikke dokumenteret for arten i fangenskab og følger klimaet i udbredelsesområdet. Om dagen skal der være 18-24 °C i terrariet og om natten 12-18 °C, så det køler naturligt af.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 50-80 %. Spray terrariet let om aftenen, så blade og bark er fugtige om natten, og lad det tørre delvis op i løbet af dagen. Konstant våde forhold giver mug og hudproblemer.
LYS OG UVB	*Dactylocnemis pacificus* er nataktiv og soler sig kun skjult nær sit dagskjul, så den har intet dokumenteret behov for UVB.
FODER	*Dactylocnemis pacificus* er altædende, men lever mest af insekter. I naturen tager den møl, fluer, biller, græshopper og andre hvirvelløse dyr, og den slikker nektar, saft fra små frugter og honningdug fra skjoldlus.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Dactylocnemis pacificus* er hurtig, nervøs og taber let halen, så håndtering holdes på et minimum. Flyt den kun, når det er nødvendigt, og lad den løbe fra hånd til hånd over en lav, blød flade. Tag aldrig fat i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	New Zealand.