herpy

GEKKOER

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri er en lille, slank gekko fra regnskovens lavland langs Madagaskars østkyst, omkring 6-8 cm inklusive hale. Den blev i mange år regnet for en del af *Ebenavia inunguis* og har først siden 2018 igen været en selvstændig art. Der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Om arten

Ebenavia boettgeri er en lille, slank gekko med spids snude. Kroppen måler 29-38 mm fra snude til kloak. Halens længde er ikke dokumenteret for arten. Hos *Ebenavia inunguis* udgør halen omkring halvdelen af totallængden, og med samme forhold bliver *E. boettgeri* omkring 6-8 cm i alt. Totallængden er altså et skøn.

Arten blev beskrevet i 1885 af den britiske zoolog George Albert Boulenger og er formentlig opkaldt efter den tyske zoolog Oskar Boettger. Allerede i 1887 blev den regnet for et synonym for *E. inunguis*, og først i 2018 blev den genindsat som selvstændig art, da en revision af slægten delte *E. inunguis* i flere arter. *E. boettgeri* kendes fra *E. inunguis* på, at rostralskjoldet, det forreste skjold på snuden, ikke rører næseboret.

Udbredelse og levested

Arten findes i regnskovens lavland langs østkysten af Madagaskar, fra Sainte Luce i sydøst til Ambodivoahangy og muligvis Ambohitralanana på Masoala-halvøen i nordøst. Den er fundet fra havniveau og op til omkring 425 m over havet. Typeeksemplaret er mærket blot "Madagaskar", så typelokaliteten er ukendt.

På Mauritius findes en bestand, som regnes for indført. Den er ikke vist på kortet, som kun viser den oprindelige udbredelse.

Oprindelig udbredelse: Madagaskar.

LEVESTED

Levestedet er varm, fugtig lavlandsregnskov fra havniveau til omkring 425 m over havet. Der findes ingen feltbeskrivelse af arten alene. *E. inunguis* lever mest i træerne, skjuler sig om dagen under bark, i dødt træ og mellem bladene på skruepalmer og *Ravenala* og går på jagt om natten. *E. boettgeri* lever formentlig på samme måde, men det er ikke dokumenteret.

Klimaet langs østkysten er varmt og meget regnfuldt hele året. I Toamasina, midt i udbredelsesområdet, er middeltemperaturen 25-31 °C om dagen og 17-23 °C om natten, den relative luftfugtighed ligger omkring 84 %, og der falder over 3.000 mm regn om året. Det er lidt køligere fra juni til august og tørrest fra september til november.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ebenavia boettgeri*. Tallene i vejledningen er lånt fra *Ebenavia inunguis*, den nærmeste og bedst kendte slægtning, og de passer med klimaet i udbredelsesområdet.

Et par kan holdes i et terrarie på 30 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). I et større terrarie kan en han holdes sammen med nogle hunner. Større er en fordel, fordi det giver flere skjul og et mere stabilt klima.

Beklæd bag- og sidevægge med naturkork, så dyrene får mere klatreflade, og stil stykker af korkbark på skrå mod væggene som skjul. Bunden er en blanding af to dele jord og en del sand. Den holdes let fugtig, men der skal også være et tørt område. Små levende planter som *Selaginella* og små bromelier giver dækning og holder på fugten. En lille vandskål og en lille skål med knust sepiaskal gør indretningen færdig.

Terrariet skal have tæt låg, for dyrene er små og kan slippe ud gennem smalle sprækker. Der skal samtidig være ventilation, så luften ikke bliver stillestående.

TEMPERATUR

Om dagen skal terrariet holdes på 26-28 °C. Om natten falder temperaturen til omkring 22 °C om sommeren og 18 °C om vinteren. Et lysstofrør giver normalt varme nok. Kan temperaturen ikke nås, kan en varmemåtte eller et varmekabel lægges under ventilationsåbningen foran, styret af en termostat.

Hold terrariet væk fra sydvendte vinduer, og mål temperaturen foroven og forneden med et digitalt termometer. Over 30 °C skal terrariet køles ned. Arten er nataktiv og har ikke brug for en solplads.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge omkring 70 %. Det er nemt at holde ved at sprøjte terrariet en gang om dagen, gerne om aftenen, så blade og bark bliver fugtige. Bunden holdes hele tiden let fugtig, men der skal også være et tørt sted, og god ventilation forebygger mug.

Dyret drikker dråber fra planter og bark efter sprøjtning. Stil desuden en lille, lav skål med frisk vand, og skift vandet hver dag. Et hygrometer viser, om fugten holder sig.

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og skjuler sig om dagen. Terrariet belyses og opvarmes med et lysstofrør, tændt 12 timer om dagen om sommeren og 10 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur. UVB er valgfrit. Et svagt UVB-rør til skyggedyr kan bruges, og der skal altid være mørke skjul, hvor dyret kan undgå lyset.

Om natten skal terrariet være helt mørkt. Levende planter trives bedre med godt lys om dagen.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Giv små insekter og andre små leddyr, der er mindre end dyrets hoved: bananfluer, springhaler, nyklækkede og små fårekyllinger og små bænkebidere. Tilbyd foder hver anden til tredje dag, og justér efter, hvor fyldig kroppen og halens rod er.

Pudr altid foderdyrene med et vitamin- og mineraltilskud, og hav en lille skål med knust sepiaskal stående, så hunnerne kan tage ekstra kalk. Fodr om aftenen, når dyret er aktivt, og tag foderdyr, der ikke bliver spist, ud af terrariet.

Vildfangne dyr kan være i dårligt huld og skal plejes op med varieret, godt foder og ro.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Ebenavia boettgeri er langsom og listende og ikke egnet til håndtering. Dyr, man forsøger at tage op, kan flygte og smide halen, og den vokser ikke ud igen i samme form. Arten er et dyr, man ser på i terrariet, især i skumringen.

Et par eller en han med nogle hunner kan holdes sammen. Om to hanner kan gå sammen, er ikke dokumenteret for arten, så hold kun én han i hvert terrarie. Giv mange skjul, hold øje med bid, manglende haler og dyr, der taber sig, og del dyrene, hvis der er uro.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Kønsforskelle og kønsmodenhed er ikke dokumenteret for arten, og faktaboksen angiver derfor intet tal. Vent med avl, til dyrene er fuldt udvoksede og i godt huld.

PARRING

Parringen er ikke beskrevet for arten. Hos *E. inunguis* kommer æg i terrarie hovedsageligt fra vildfangne hunner, der allerede er drægtige, og kun sjældent fra senere æglægninger. Avl lykkes derfor sjældent, og det er ikke kendt, hvad der får dyrene til at yngle.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger sandsynligvis 1-2 æg ad gangen som *E. inunguis*, men tallet er ikke dokumenteret for *E. boettgeri*. Giv hunnen flere skjulte, let fugtige æglæggesteder, fx korkrør og lommer med fugtig jord, og tjek dem uden at forstyrre. Antal kuld om året er ikke dokumenteret.

INKUBATION

Flyt æggene forsigtigt til en lille boks med let fugtigt substrat, fx perlit eller vermiculit, uden at vende dem. Boksen skal have små lufthuller og stå ved stabil temperatur. Hold substratet let fugtigt, men ikke vådt. Æg, der falder sammen og bliver mugne, er som regel døde.

Faktaboksens 60-90 dage ved 24-27 °C er et skøn ud fra lignende små gekkoer og ikke målt på arten.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne er meget små og lever af mikrofoder som springhaler og bananfluer samt de mindste nyklækkede fårekyllinger. Hold dem i et lille, tæt terrarie med fugtigt substrat, skjul og samme temperatur som de voksne. Giv foder hver dag, pudret let med kalk, og hold øje med væksten.

Sundhed og typiske fejl

Levealderen er ikke dokumenteret, og 5-8 år i faktaboksen er et skøn. De typiske problemer er de samme som hos andre små, skovlevende gekkoer:

- For meget varme og for tør luft, som giver stress, udtørring og manglende appetit.
- Konstant våd bund og dårlig ventilation, som giver mug og hudproblemer.
- Mangel på kalk og D3-vitamin, som giver bløde knogler. Pudr foderdyrene og hav sepiaskal stående.
- Hudrester på tæer og halespids ved for tør luft. Sørg for en fugtig del i terrariet.
- Vildfangne dyr i dårligt huld. De skal plejes op med godt foder og ro.
- Tabt hale efter håndtering eller slagsmål.

Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig eller ikke vil spise.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.