herpy

GEKKOER

Western Indian leopard gecko

Eublepharis fuscus

En kraftig, jordlevende gekko fra det vestlige Indien med mørke pletbånd over ryggen, fløjlsagtig hud og bevægelige øjenlåg. Den er nataktiv, spiser insekter og skal have højere luftfugtighed end sin nære slægtning *Eublepharis macularius*. Der findes kun få beskrevne pasningserfaringer for netop denne art, så meget af vejledningen bygger på slægtningen.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Eublepharis macularius fuscus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**16-21 °C**
Luftfugtighed	**60-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-10 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**6-8**
Inkubation	**35-89 dage** ved 27-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne og ikke i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES- eller EU-dokumenter ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Terrariemålene er lånt fra *Eublepharis macularius*. Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), og bundarealet er vigtigere end højden, fordi arten lever på jorden.

TEMPERATUR

Der er ikke målt temperaturer for arten i naturen, og kun få angivelser for fangenskab.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Eublepharis fuscus skal have meget højere luftfugtighed end *E. macularius*. Hold den over 60 %, med stigninger op til 85 % om natten, og om sommeren omkring 75 %. Om vinteren må fugten falde lidt.

LYS OG UVB

Arten er aktiv i skumringen og om natten, men lys om dagen regulerer døgnrytmen og stimulerer appetitten. Giv omkring 14 timers lys om sommeren og skru gradvist ned til omkring 8 timer om vinteren, helst styret af et tænd-sluk-ur.

FODER

Dyret spiser kun insekter, og dette afsnit er lånt fra *Eublepharis macularius*. Giv fårekyllinger, mel- og kæmpemelorme, dubia-kakerlakker, silkeorme og larver af sort soldaterflue i skiftende rækkefølge.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er sky om dagen og aktiv ved skumring og om natten. Lad nye dyr falde til i to uger, før de håndteres, og vænn dem derefter til hånden med korte seancer på omkring 5 minutter.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Indien.