herpy

GEKKOER

East Indian leopard gecko

Eublepharis hardwickii

En kraftig, jordlevende gekko fra skovene i det østlige Indien og Bangladesh med brede mørkebrune og lyse bånd og en tyk hale, der gemmer fedt. Den er nært beslægtet med *Eublepharis macularius*, men skal holdes køligere og fugtigere og er stadig sjælden i terrarier.

Familie: Eublepharidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-23 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**50-60 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**15-18 °C** 6-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-6**
Inkubation	**50-70 dage** ved 26-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten er sjælden i handlen, så spørg efter dokumentation for, at dyret er opdrættet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr bør have et terrarie på mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), samme minimum som for *Eublepharis macularius*.

TEMPERATUR
Eublepharis hardwickii skal holdes køligere end de andre arter i slægten. Om dagen skal baggrunden være 25-26 °C, og det varmeste sted må ikke blive over 28-30 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være langt højere end hos *Eublepharis macularius*. Anbefalingerne ligger på 60-80 %, enkelte steder lavere, ned til 40-60 %.

LYS OG UVB
Arten er strengt nataktiv og mest aktiv de første timer efter mørkets frembrud. Giv omkring 12 timers lys om dagen og op til 14 timer i avlssæsonen. Under vinterhvilen er lys ikke nødvendigt.

FODER
Eublepharis hardwickii lever udelukkende af insekter og opdager byttet på bevægelsen. Den tager fårekyllinger, græshopper, kakerlakker og melorme, men nogle dyr vil ikke have melorme.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er sky og rolig, langsommere end *Eublepharis macularius*, men den bliver hurtig, når der kommer foder. Den lader sig håndtere og kan blive tam med regelmæssig kontakt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Indien og Bangladesh.