herpy

GEKKOER

Satpura leopard gecko

Eublepharis satpuraensis

En mellemstor, jordlevende gekko fra løvfældende skove i det centrale Indien, med bevægelige øjenlåg, fløjlsagtig hud og lyse tværbånd over ryg og hale. Den er nataktiv og lever af insekter. Arten blev først beskrevet i 2014, og pasningen bygger på den nært beslægtede *Eublepharis macularius*.

Familie: Eublepharidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**6-8**
Inkubation	**35-89 dage** ved 27-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne og ikke i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES- eller EU-dokumenter ved køb og salg.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Eublepharis satpuraensis*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt med en kølig, tør vinter, og levestedet er løvfældende skov.
TEMPERATUR	Under varmekilden skal overfladen være 32-35 °C, og et varmt skjul skal ligge omkring 32 °C. Resten af terrariet holdes på 24-29 °C, køligst i den modsatte ende.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden holdes på 40-60 %, og terrariet skal have god ventilation, så luften ikke bliver stillestående.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten, men lys om dagen regulerer døgnrytmen. Giv omkring 12-14 timers lys om sommeren og skru gradvist ned til omkring 8-10 timer om vinteren, helst styret af et tænd-sluk-ur.
FODER	Dyret spiser kun insekter. Giv fårekyllinger, mel- og kæmpemelorme, dubia-kakerlakker, silkeorme og larver af sort soldaterflue i skiftende rækkefølge, mindst tre slags.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky om dagen og aktiv fra skumringen. Lad nye dyr falde til i to uger, før de håndteres, og vænn dem derefter til hånden med korte seancer på omkring 5 minutter.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/eublepharis-satpuraensis