herpy

GEKKOER

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae er en lille, slank klatrer fra skovene i det nordvestlige Ny Kaledonien med oliven- til mosgrøn, kornet skælhud og gule aftegninger ved munden og på lemmerne. Den tåler varme dårligt, men er ikke svær at holde i et køligt, fugtigt og tæt beplantet terrarie.

Familie: Diplodactylidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-6 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**5-7**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten er vurderet som næsten truet (NT) af IUCN. Spørg sælgeren, om dyret er opdrættet, og få herkomsten bekræftet.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent eksemplar af *Eurydactylodes agricolae* eller et par kan holdes i et terrarie på mindst 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde), og højere er altid bedre.

TEMPERATUR

Eurydactylodes agricolae kommer fra skove med moderat temperatur og tåler varme dårligt. Hold 18-24 °C om dagen, og dyrene klarer sig godt ved almindelig stuetemperatur. Om natten må temperaturen gerne falde til 16-20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden hos *Eurydactylodes agricolae* skal være moderat til høj og svinge i løbet af døgnet. Sigt efter 60-70 % i dagtimerne og 80-90 % efter sprøjtningen om aftenen.

LYS OG UVB

Døgnrytmen hos *Eurydactylodes agricolae* er uklar: arten beskrives både som nataktiv og som dagaktiv, og den ses ofte sole sig under UVB-lyset.

FODER

Grundfoderet for *Eurydactylodes agricolae* er en færdigblandet pulverkost til frugtædende nykaledonske gekkoer, fx fra Pangea, Repashy eller Gecko Nutrition, som røres op til en smidig grød.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Eurydactylodes agricolae er lille, hurtig og skrøbelig og først og fremmest et dyr at se på. Med tålmodighed kan den vænne sig til kort, rolig håndtering.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Ny Kaledonien.