herpy

GEKKOER

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis er den mindste art i slægten af nykaledonske chamæleongekkoer: en lille, nataktiv trægekko med gribehale, som kun lever i kystlavlandet på vestsiden af Grande Terre. Arten blev først beskrevet i 2009, er truet i naturen og ses kun sjældent i fangenskab. Pasningen bygger på slægtningene *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*.

Familie: Diplodactylidae

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står ikke på CITES-listerne og ikke i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES- eller EU-dokumenter ved køb og salg.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Eurydactylodes occidentalis*. Tallene er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, som har næsten samme levevis og størrelse.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-26 °C i det meste af terrariet og en varm plads under en lampe på 27-29 °C. Om natten skal temperaturen falde til 20-23 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold luftfugtigheden på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den er lavest i den varme ende og højest i den kølige. Den skal stige om natten og falde i løbet af dagen, men aldrig komme under 50 %.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kan klare sig uden UVB, når foderet indeholder D3-vitamin, men et svagt UVB-lys er en fordel.
FODER	Arten er formentlig frugt- og insektæder som resten af slægten. Giv omkring halvdelen færdigfoder til frugtædende gekkoer, rørt op til en tyk grød, og halvdelen levende insekter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Eurydactylodes occidentalis* er lille og rolig, og slægtens arter kan vænnes til kort håndtering. Lad et nyt dyr få to uger i fred, og håndtér det kun, hvis det har spist.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ny Kaledonien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/eurydactylodes-occidentalis