herpy

GEKKOER

Symmetrical gecko

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus er en lille, nataktiv og sjælden gekko fra krat og skov i det sydlige Ny Kaledonien, med store, symmetrisk ordnede hovedskæl og en gribehale. Den er langt mindre kendt end slægtningene *Eurydactylodes agricolae* og *Eurydactylodes vieillardi*, men pasningen er formentlig næsten ens.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Eurydactylus symmetricus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Eurydactylodes symmetricus*. Tallene her er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, der har samme størrelse og levevis.
TEMPERATUR	Giv en varm plads under en lampe på 27-29 °C og en kølig zone på 21-24 °C. Om dagen ligger temperaturen i det meste af terrariet på 22-26 °C, og om natten falder den til 20-23 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold luftfugtigheden på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den skal stige om natten og falde i løbet af dagen, men aldrig komme under 50 %.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og kan klare sig uden UVB, når foderet indeholder D3-vitamin, men svagt UVB-lys er en fordel.
FODER	Arten er formentlig frugt- og insektædende som slægtens øvrige arter. Giv omkring halvdelen færdigfoder til frugtædende gekkoer, rørt op til en tyk grød i en skål på en væghængt hylde, og halvdelen levende insekter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Slægtens arter er små, forholdsvis rolige og kan vænnes til håndtering. Lad et nyt dyr få to uger i fred, og håndtér det kun, hvis det har spist.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ny Kaledonien.