herpy

GEKKOER

Symmetrical gecko

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus er en lille, nataktiv og sjælden gekko fra krat og skov i det sydlige Ny Kaledonien, med store, symmetrisk ordnede hovedskæl og en gribehale. Den er langt mindre kendt end slægtningene *Eurydactylodes agricolae* og *Eurydactylodes vieillardi*, men pasningen er formentlig næsten ens.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Eurydactylus symmetricus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Om arten

Eurydactylodes symmetricus er en lille, slank gekko med trekantet hoved, store øjne uden låg og lodrette pupiller. Hovedskællene er store, pladeformede og ordnet symmetrisk uden små korn imellem, og i nakken sidder et kors af hævede knopper. Kroppens skæl er ellers ret ensartede uden særligt store, flade skæl, og det adskiller arten fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*. Fra mundvigen løber en gul fure tilbage forbi øreåbningen. Kroppen er typisk lys med mørkere marmorering, der nogle gange danner tværbånd, og bugen er hvid.

Kroppen (snude til kloak) måler op til omkring 6 cm, og den gribende hale er 100-107 % af kropslængden, så den samlede længde ligger omkring 10-13 cm. Vægten er ikke dokumenteret.

Arten blev beskrevet af den svenske zoolog Lars Gabriel Andersson i 1908 som *Eurydactylus symmetricus*. Den er sjælden i naturen. Slægten har fire arter.

Levetiden er ikke dokumenteret. *E. vieillardi* og *E. agricolae* kan leve mindst 10 år.

Udbredelse og levested

Eurydactylodes symmetricus lever kun i den sydlige del af hovedøen Grande Terre i Ny Kaledonien. Udbredelsen strækker sig fra Pic Ningua i nord til Prony i syd og omfatter bl.a. Rivière Bleue og Goro-plateauet i det sydlige bjergland.

> **Oprindelig udbredelse:** Ny Kaledonien.

LEVESTED

Arten lever i maquis, et tæt krat på de næringsfattige ultramafiske jorder i det sydlige Ny Kaledonien, og i lukket, fugtig skov, fra omkring 20 til 1.050 meters højde. Den er nataktiv og lever i buske og træer. Klimaet er subtropisk med en varm, fugtig tid og en køligere, tørrere tid på året.

Arten er næsten truet (NT). I skovene går den tilbage, hvor den invasive myre *Wasmannia auropunctata* er talrig, og krattet forringes af gentagne brande og minedrift.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Eurydactylodes symmetricus*. Tallene her er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, der har samme størrelse og levevis. Til ét voksent dyr skal terrariet være mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er altid bedre, og højden er vigtigere end bundarealet, fordi arten klatrer. Et par eller en han med to hunner kan holdes sammen; uden avl er der ingen grund til mere end ét dyr. Et glasterrarie med net i låget passer godt.

Indret med mange tynde grene i forskellige tykkelser, lianer, kork og blade, så dyret kan klatre og sove i løvet. Der skal være skjul i alle højder. Levende planter hjælper med at holde på fugten. Som bund fungerer 60 % økologisk muldjord og 40 % kokosfiber med et tykt lag blade ovenpå. Fjern ekskrementer dagligt, og skift hele bunden hver tredje til fjerde måned.

TEMPERATUR

Giv en varm plads under en lampe på 27-29 °C og en kølig zone på 21-24 °C. Om dagen ligger temperaturen i det meste af terrariet på 22-26 °C, og om natten falder den til 20-23 °C. En svag varmepære på omkring 40 W over en gren øverst i terrariet er den enkleste opvarmning. Varmen er højest foroven, så der skal være grene og løv i alle højder. Over 30 °C er for varmt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Hold luftfugtigheden på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den skal stige om natten og falde i løbet af dagen, men aldrig komme under 50 %. Sprøjt terrariet grundigt hver aften og om morgenen efter behov, så dyret kan drikke dråber fra bladene. Stil desuden en skål med frisk vand, og lad bund og grene tørre op mellem sprøjtningerne.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og kan klare sig uden UVB, når foderet indeholder D3-vitamin, men svagt UVB-lys er en fordel. Et UVB-rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1), fx et T5-rør på 7 %, placeres 20-30 cm over nettet eller 25-40 cm under nettet. Målet er et UV-indeks på 1-2 på den øverste gren. Der skal altid være skygge i resten af terrariet. Hold lyset tændt 10-12 timer om vinteren og lidt længere om sommeren.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

FODER

Arten er formentlig frugt- og insektædende som slægtens øvrige arter. Giv omkring halvdelen færdigfoder til frugtædende gekkoer, rørt op til en tyk grød i en skål på en væghængt hylde, og halvdelen levende insekter. Unger op til et år får insekter hver anden dag og grød 2-3 gange om ugen; voksne får insekter og grød 2-3 gange om ugen. Egnede insekter er fårekyllinger, kakerlakker, græshopper, silkeorme og voksmøl, ikke længere end afstanden mellem dyrets øjne. Pudr insekterne med kalk og D3-vitamin, og giv et multivitamin en gang om måneden.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Slægtens arter er små, forholdsvis rolige og kan vænnes til håndtering. Lad et nyt dyr få to uger i fred, og håndtér det kun, hvis det har spist. Hold sessionerne under fem minutter, støt fødder, krop og hale, og tag aldrig fat i halen. Håndtér helst om aftenen.

E. vieillardi og *E. agricolae* kan sprøjte en klæbrig, ildelugtende væske fra halen, når de forskrækkes, og den giver smertefuld irritation, hvis den rammer øjnene. Om *E. symmetricus* kan det samme, er ikke dokumenteret, men håndtér dyret på samme måde, og vask hænder bagefter.

Et par eller en han med to hunner kan gå sammen, men to hanner må ikke holdes sammen.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder og vægt ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret for *Eurydactylodes symmetricus*. Hannerne har en tydelig hemipenisbule og voksagtige, ofte gule porer foran kloakken. Dyrene bør være fuldt udvoksede og i god foderstand, før de sættes i avl.

PARRING

Hos *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae* stimulerer en hvileperiode på to til tre måneder med 20-22 °C om dagen og under 12 timers lys æglægningen, hvorefter lys og temperatur hæves igen. Par og små grupper med en han og to hunner kan gå sammen hele året. Det er ikke dokumenteret for *E. symmetricus*.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten er æglæggende. Kuldstørrelsen er ikke dokumenteret; slægtens øvrige arter lægger et til to æg ad gangen med tre til fire ugers mellemrum. Giv hunnen en æglæggekasse med mindst 10 cm dybde, fyldt med en fugtig blanding af tørv og vermiculite, så hun kan grave. Hold øje med æg uden for kassen. Giv hende rigeligt med kalk og insekter i hele sæsonen.

INKUBATION

Inkubationen er ikke beskrevet for *Eurydactylodes symmetricus*; tallene er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*. Flyt æggene forsigtigt, uden at vende dem, til en boks med fugtig vermiculite, og åbn låget hver fjerde til syvende dag, så luften skiftes. Ved 22-26 °C klækker æggene efter 50-90 dage; angivelserne svinger fra omkring 50 dage til 70-90 dage ved 23-24 °C.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af unger er ikke beskrevet for *Eurydactylodes symmetricus*. Hos slægtens øvrige arter får ungerne samme pasning som de voksne, med kraftig daglig sprøjtning, så de kan drikke dråber, og god ventilation. Mangel på vand er den hyppigste årsag til, at ungerne ikke trives, men for fugtigt og uden luft giver åndedrætsinfektioner.

Sundhed og typiske fejl

Der findes ikke sundhedsdata for *Eurydactylodes symmetricus*. Typiske problemer hos slægten skyldes pasningen:

- Vedvarende for høj eller for lav fugt, som giver hud- og åndedrætsproblemer. Hold fugten på 60-80 %, og lad terrariet tørre op i løbet af dagen.
- For meget varme. Hold temperaturen under 30 °C.
- Mangel på kalk og D3-vitamin, især hos hunner i avl.
- Tab af halen. Tag aldrig fat i halen.

Søg en dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig, ikke spiser i flere uger eller virker slapt.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/eurydactylodes-symmetricus