herpy

GEKKOER

Bavay's gecko

Eurydactylodes vieillardi

Eurydactylodes vieillardi er en lille, rolig og nataktiv gekko fra skovene på Ny Kaledoniens hovedø, med store, uregelmæssige skæl, der ligner oliedråber på vand, og en gribehale. Den kan sprøjte en dårligt lugtende væske fra halen, når den bliver forskrækket.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Platydactylus vieillardi; Eurydactylus vieillardi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**4-12 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**50-90 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten er ikke opført under CITES og står ikke på nogen af bilagene i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav til husdyrhold gælder. Arten er på IUCN's rødliste vurderet som næsten truet.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Til ét voksent dyr skal terrariet være mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er altid bedre, og højden er vigtigere end bundarealet, fordi arten klatrer.

TEMPERATUR
Eurydactylodes vieillardi er nataktiv og trives bedst ved moderate temperaturer. Giv en varm plads under en lampe på 27-29 °C og en kølig zone på 21-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten trives bedst i høj luftfugtighed, og et gennemsnit på 60-80 % er målet, målt midt i terrariet. Det er naturligt, at fugten er lavere i den varme ende og højere i den kolde.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv, men søger i dagtimerne ud på grene og soler sig. Den kan klare sig uden UVB, når den får D3-vitamin gennem foderet, men trives bedre med svagt UVB-lys, som også fremhæver farverne.

FODER
Arten æder både insekter og frugt. Foderet kan sammensættes af omkring halvdelen færdigfoder i pulverform til frugtædende gekkoer, som røres op med vand til en tyk grød, og halvdelen levende insekter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Eurydactylodes vieillardi er en lille, robust og forholdsvis langsom gekko, som kan blive ret tam. Lad et nyt dyr få to uger i fred, før håndteringen begynder, og kun hvis det har spist.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Ny Kaledonien.