herpy

GEKKOER

Kuhl's flying gecko

Gekko kuhli

En næsten usynlig barkskygge fra regnskovene i Sydøstasien. Hudflapper langs krop, ben og hale, svømmehud mellem tæerne og en barkagtig tegning gør, at den kan svæve ned fra træ til træ. Den er et dyr at kigge på, ikke at røre ved, og den kræver høj luftfugtighed.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Ptychozoon kuhli; Ptychozoon homalocephalum* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**60-85 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), og IUCN regner den som ikke truet (LC). Der kræves derfor ingen CITES-papirer ved køb og salg. Mange dyr i handlen er dog fanget i naturen, så spørg efter opdrættede dyr. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Tjek de aktuelle danske regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du køber.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Brug et højt terrarie med frontlåger. Til ét dyr er 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde) en god minimumsstørrelse, og højden betyder mere end bundarealet, fordi *Gekko kuhli* aldrig går på jorden.
TEMPERATUR	Her er angivelserne ikke helt enige. Nogle er omkring 24-29 °C i terrariet om dagen og et varmt sted øverst på 30-33 °C, mens andre går op til 32-35 °C på varmestedet.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Gekko kuhli* har brug for høj luftfugtighed, typisk 70-85 %, og den må gerne falde til omkring 60 % i løbet af dagen.
LYS OG UVB	*Gekko kuhli* er aktiv i skumringen og om natten og kan overleve uden UVB. Et svagt UVB-lys er dog en god idé, for undersøgelser tyder på, at det gavner dyrets sundhed.
FODER	*Gekko kuhli* lever af levende insekter. Giv en varieret blanding af små fårekyllinger, dubia-kakerlakker, turkestanske kakerlakker, soldaterfluelarver og af og til voksmøllarver som godbid.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Gekko kuhli* er rolig, men sky. Den tilbringer dagen ubevægelig på barken, og når man nærmer sig, flygter den eller spreder hudfolderne og hopper. Den skal ikke håndteres rutinemæssigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Thailand, Myanmar (Burma), Malaysia, Singapore og Indonesien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/gekko-kuhli