herpy

GEKKOER

Striped leaf-toed gecko

Goggia lineata

Goggia lineata er en bittelille, bleggrå og stribet gekko fra den vestlige del af Sydafrika og det sydligste Namibia. Den bliver kun omkring 4 cm inklusive hale og er en af de mindste øgler i det sydlige Afrika. Den er nataktiv og lever skjult under sten og vækster. Der findes næsten ingen viden om pasningen, så vejledningen bygger på klimaet og levestedet.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Phyllodactylus lineatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 20 × 20 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-28 °C**
Temperatur, nat	**10-18 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes ingen dokumenteret pasning af *Goggia lineata*. Vejledningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet, levestedet og dyrets størrelse på omkring 4 cm.

TEMPERATUR

Temperaturen er ikke målt på dyrene selv, men følger klimaet i udbredelsesområdet: 24-28 °C om dagen og 16-18 °C om natten om sommeren og en kølig vinter med 18-20 °C om dagen og 10-12 °C om natten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i dyrets skjul er ikke dokumenteret. Kystklimaet er fugtigt, indlandet tørrere, og vinteren er den fugtige årstid. Faktaboksens 50-70 % er et skøn.

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og skjuler sig om dagen. UVB er ikke dokumenteret som nødvendigt og er valgfrit. Et svagt UVB-rør til skyggedyr kan bruges over en del af terrariet, hvis der er mørke skjul, hvor dyret kan undgå lyset.

FODER

I naturen æder arten især myrer og termitter, så giv de allermindste foderdyr: bananfluer, springhaler og de mindste nyklækkede fårekyllinger. Byttet skal være mindre end dyrets hoved.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Goggia lineata er lille, sky og hurtig og er ikke egnet til håndtering. Den holder sig under dække det meste af tiden og kommer frem i skumringen og om natten.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sydafrika og Namibia.