herpy

GEKKOER

Yellow-headed gecko

Gonatodes albogularis

En lille, dagaktiv gekko fra Mellemamerika, Colombia, Venezuela og de store Caribiske øer. Hannen har gult til orangegult hoved og mørk krop, mens hunnen er brunplettet. Arten har ingen hæftelameller, men klatrer og jager i dagslys og passer godt i et tæt beplantet, højt terrarie.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Gymnodactylus albogularis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**10-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**60-100 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført på CITES eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav til pasning og hold af dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Arten trives i et lodret terrarie. En enkelt voksen gekko kan holdes i omkring 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde), og et par skal have mindst 40 × 30 × 45 cm. Større er bedre, fordi aktive dyr bruger hele rummet.

TEMPERATUR

Gonatodes albogularis skal have 24-28 °C om dagen. Et lille varmere område på 28-30 °C er fint, men arten soler sig næsten ikke, og der skal altid være køligere, skyggefulde steder at trække ind i.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %, og der skal være god ventilation. Sprøjt terrariet én gang om dagen, så der sidder dråber på blade, kork og ruder, som gekkoerne kan drikke af.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have lys 11-13 timer i døgnet. Dagslysrør af typen T5 giver både lys og en smule varme og er nok i sig selv.

FODER

Arten lever af små insekter og andre bytter, som er mindre end afstanden mellem dyrets øjne. Voksne dyr kan få små fårekyllinger, vingeløse bananfluer, små kakerlakker, stuefluer, møl, ildkræ og små melorme.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er mere sky end daggekkoer af slægten *Phelsuma*, men ses ofte, især ved fodring. Den skal ikke håndteres. Den er lille og hurtig, og et enkelt hop eller et fald kan give en skade eller en flugt.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Cuba, Haiti, Jamaica og Caymanøerne.