herpy

GEKKOER

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

En lille, dagaktiv gekko fra Venezuela, Colombia og øerne ud for kysten, hvor hannen bærer en hvid stribe med sort kant ned ad ryggen og et gult hoved. Den klatrer på træstammer og mure, men kan ikke gå op ad glas, og den klarer sig fint i et lille terrarie, hvis den holdes alene eller som par.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-60 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**65-110 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført i CITES og ikke i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller flytning. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par kan holdes i et terrarie på 30 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). Det er et minimum, og et større terrarie er bedre, især hvis flere dyr deles.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 24-27 °C i terrariet. Et varmt sted på 29-32 °C kan laves med en varmemåtte eller en lampe, men det er ikke nødvendigt, hvis temperaturen ellers er høj og stabil.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Gonatodes vittatus trives i en tørrere luft end de fleste tropiske gekkoer. Hold luftfugtigheden på 50-60 %.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv, men om den har brug for UVB, er omdiskuteret. UV-lys mistænkes for at give problemer med hudskiftet, men dyr under UV-lys synes til gengæld at yngle lettere.

FODER
Gonatodes vittatus æder insekter og andre små leddyr. Unger kan tage dyr, der svarer til nålehoveder: nyklækkede fårekyllinger (op til cirka 3 mm), bananfluer (*Drosophila melanogaster*), springhaler og små hvide isopoder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er dristig og nysgerrig og ses ofte om dagen, men den er ikke et dyr, der skal håndteres. Huden kan rives itu, hvis dyret grebes, og dyrene stresses let. Nyd den i stedet fra den anden side af glasset.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad og Tobago, Aruba og Curaçao.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/gonatodes-vittatus