herpy

GEKKOER

Vietnamese leopard gecko

Goniurosaurus araneus

En spinkel, langbenet tigergekko fra karstbjergene på grænsen mellem Nordvietnam og Sydkina, med fire brede orange bånd på rustbrun grund. Artsnavnet *araneus* kommer af det latinske ord for edderkop. Gekkoen trives ved stuetemperatur og høj luftfugtighed og er truet i naturen, så den kræver både papirer og en holder med erfaring.

Familie: Eublepharidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**19-22 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**45-80 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten er omfattet af slægtslistningen af *Goniurosaurus* på CITES bilag II og står derfor på bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr. Du skal kunne dokumentere, at dyret er lovligt erhvervet, fx med opdrætterens papirer, og ved indførsel fra lande uden for EU kræves CITES-tilladelser. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten er truet og formentlig forsvundet fra sin typelokalitet i Vietnam, så køb kun dyr, der er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde), og et par eller en trio med en han og to hunner skal have omkring 90 cm i længden.
TEMPERATUR	Arten er en kølig gekko, som sjældent har brug for ekstra varme i en dansk stue. Om dagen passer 22-26 °C, og om natten må temperaturen falde til 19-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 60-90 %: højest om natten efter sprøjtning og lidt lavere om dagen. Om dagen kan den falde til omkring 50 %, når aftenens sprøjtning løfter den til 90 % igen.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten og sidder dagen over i skjul, så den bruger ikke lyset til at varme sig. En fast døgnrytme er nok, fx T5-rør 11,5-12 timer om dagen om sommeren og 8-10,5 timer om vinteren.
FODER	Arten er insektæder og tager næsten alt, der er lille nok. Giv fårekyllinger, dubia-kakerlakker, græshopper og silkeorm, og skift gerne mellem flere slags. Byttet må ikke være større end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og hurtig og forsvinder i skjul, når den bliver forskrækket. Den egner sig ikke til håndtering, så tag den kun op, når bunden skiftes, eller den skal vejes. Giv nye dyr mindst to uger i ro.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Vietnam og Kina.