herpy

GEKKOER

Chinese leopard gecko

Goniurosaurus luii

En slank, nataktiv tigergekko fra de skovklædte kalkstensbjerge på grænsen mellem Sydkina og Nordvietnam, med orange øjne og smalle gule bånd på lysebrun grund. Den lever skjult i klippesprækker og vil have det køligt og fugtigt. I naturen er den sårbar, så kun opdrættede dyr hører hjemme i terrariet.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Goniurosaurus kadoorieorum* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-24 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-90 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**45-80 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Alle tigergekkoer undtagen de japanske arter står på CITES bilag II og på bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr. Ved køb og salg inden for EU skal du kunne dokumentere dyrets lovlige oprindelse, fx med opdrætterens papirer, som du gemmer. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelser. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Køb kun opdrættede dyr: indsamling til dyrehandlen er en af de største trusler mod de vilde bestande.

Om arten

Goniurosaurus luii hører til tigergekkoerne, en slægt af øjenlågsgekkoer fra Sydkina, Vietnam og Japan. Den er slank og let bygget, med lange, tynde ben, et trekantet hoved og store øjne med lodret pupil og bevægelige øjenlåg. Iris er klart orange, og over øjnene sidder en række tydeligt forstørrede skælknopper, som er et af artens kendetegn.

Hoved, krop og ben er lysebrune til gråbrune med små mørke pletter. Hen over kroppen ligger smalle, uplettede bånd i gult eller orangebrunt, hvert med en tynd mørk kant: et V-formet nakkebånd, tre bånd mellem for- og bagben og et ved halens rod. Halen er næsten sort med tre til seks hvide bånd. Ungerne ser anderledes ud end de voksne, og farverne skifter gradvist, mens de vokser.

I en stor opmåling af dyr fra Vietnam og Kina målte voksne hanner i gennemsnit 109 mm fra snude til kloak og hunnerne 112 mm, med en hale på omkring 72 mm. Med hale bliver arten altså omkring 18-24 cm, og kønnene er næsten lige store. Hannerne kendes på en række porer foran kloakken og en tydelig fortykkelse ved halens rod. Halen kan smides, hvis dyret

bliver grebet. Den vokser ud igen, men ser anderledes ud.

Arten blev beskrevet i 1999 ud fra dyr fra Pingxiang i den kinesiske provins Guangxi og er opkaldt efter Wai Lui, som brugte seks år på at opspore bestandene. I 2006 blev den også fundet i Vietnam. Den nærtstående *Goniurosaurus kadoorieorum*, der blev beskrevet i 2015, regnes nu for samme art, fordi den ikke kan skelnes på sikre kendetegn. Slægten er revideret mange gange, og i hobbyen bliver tigergekkoerne tit blandet sammen, så erfaringer med andre arter skal tages med forbehold.

Der er offentliggjort forholdsvis lidt om pasningen af netop denne art. Flere tal i vejledningen er derfor lånt fra den nært beslægtede *Goniurosaurus huuliensis*, som er avlet i fangenskab siden 2019, og hvis pasning er godt beskrevet. Det fremgår ved de enkelte tal.

Gekkoen er sky og forsigtig og ikke et dyr til daglig håndtering. Til gengæld er den fascinerende at følge i et godt indrettet terrarie, når den kommer frem efter mørkets frembrud.

Udbredelse og levested

Arten lever i et lille område med kalkstensbjerge på begge sider af grænsen mellem Sydkina og Nordvietnam. I Kina findes den i det sydvestlige Guangxi, hvor typelokaliteten ligger ved Pingxiang, og i Nonggang-reservatet nordøst for floden Zuojiang. I Vietnam kendes den fra provinserne Cao Bang og Lang Son, bl.a. fra Ha Lang-distriktet i Cao Bang. Det første vietnamesiske fund blev meldt i 2006, og Lang Son kom til i 2016.

Øen Hainan nævnes undertiden også som levested, men de nyere feltundersøgelser kender kun arten fra fastlandet, og Hainan er derfor ikke med på kortet. Bestandene er små og spredte. Ved typelokaliteten er arten ikke genfundet, sandsynligvis fordi den er indsamlet til dyrehandlen.

> **Oprindelig udbredelse:** Kina og Vietnam.

LEVESTED

Gekkoen lever i kalkstensbjerge (karst) dækket af stedsegrøn løvskov, omkring 100-700 meter over havet. I Cao Bang er den fundet i ca. 364 meters højde. De fleste dyr ses på klippevægge og store sten, kun få på skovbunden eller i grene. Om dagen gemmer de sig i sprækker og huler, og om natten kommer de frem for at jage insekter og andre smådyr. I Nonggang-reservatet sidder arten helst på sydvendte skråninger.

Klimaet er ikke målt ved netop denne art. Ved den nærtstående *Goniurosaurus catbaensis* på Cat Ba-øerne i Vietnam er der i sommermånederne målt 70-99 % luftfugtighed og 22-28 °C på underlaget, hvor dyrene sad. Det giver et godt billede af, hvad slægten er vant til: høj luftfugtighed og moderat varme. Tigergekkoerne er aktive i sommerhalvåret og holder en kølig pause om vinteren, og den rytme skal efterlignes i terrariet, hvis dyrene skal avle.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

Pasning

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Til et par eller en han med to hunner af *Goniurosaurus huuliensis* anbefales mindst 80 × 50 × 50 cm, og til par og trioer af luii-gruppen er 90 cm i længden et godt mål. Arten tilbringer næsten hele sin aktive tid på bagvæggen og jager oppefra, så den skal have både højde og noget at klatre på. Unger vokser bedst op i en faunaboks eller et lille terrarie, hvor de nemt finder foder og vand (se opdræt).

Indret terrariet som et landskab af skjul: korkrør, korkbark, flade sten, rødder og grene foran en bagvæg af kork eller et strukturpanel, der ligner klippe. Jo flere sprækker og huler, jo mere trygge bliver dyrene, og jo oftere viser de sig. Et fugtigt skjul med sphagnum hjælper dem gennem hudskiftet.

Som bund passer en blanding af gødningsfri plantejord og sand eller kokosfibre, gerne med et lag blade ovenpå. Et drænlag nederst forhindrer, at vandet bliver stående og giver mug og bakterier. Planter som pothos, ficus og bregner giver fugt og skjul. Gekkoerne bruger ofte et fast toiletsted, som er nemt at holde rent. Sørg for god ventilation, så luften ikke står stille.

Læs mere: Terrarieopbygning og bioaktiv bund

TEMPERATUR

Arten vil have det køligt og har sjældent brug for ekstra varme i en dansk stue. Om sommeren passer 22-26 °C om dagen, og om natten må temperaturen falde til 18-22 °C. Typisk bruges 24-26 °C om dagen og 20-22 °C om natten, og *Goniurosaurus huuliensis* holdes ved 23,5-26 °C fra marts til oktober med et lille fald om natten.

Varme er den største fare. Tigergekkoer tåler ikke længere tid over 28 °C, og vedvarende varme kan slå dem ihjel. Faktaboksen har derfor ingen varmeplet: lokalt op til 28 °C kan tåles, men det er ikke nødvendigt. Stil terrariet væk fra solrige vinduer, og mål med et digitalt termometer både foroven og forneden.

Skal dyrene avle, får de en kølig vinterpause på to til tre måneder ved 18-22 °C. Både 19-22 °C om dagen og 18-20 °C om dagen med 14-16 °C om natten har givet gode resultater. Bagefter hæves temperaturen langsomt igen (se parring).

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være høj, men luften må ikke stå stille. For arten angives 60-80 %, og *Goniurosaurus huuliensis* holdes ved 70-90 %. Spray terrariet hver aften, så der kommer dråber på bagvæg, planter og blade, og lad det tørre lidt op i løbet af dagen. Gekkoerne slikker vandet af underlaget, og sprayvandet er tit deres vigtigste drikkevand. Stil alligevel en lav skål med frisk vand, som skiftes dagligt.

Arten tåler dårligt at blive tør i længere tid: dyrene svækkes, får problemer med hudskiftet og kan dø. Bunden må omvendt heller ikke stå konstant våd, så brug dræn og god ventilation. Om vinteren sprayes der lidt mindre. Et hygrometer viser, om rytmen holder.

LYS OG UVB

Gekkoerne er aktive i skumringen og om natten og har kun brug for svagt lys fra LED-lister eller T5-rør, der giver en fast døgnrytme. *Goniurosaurus huuliensis* får 11,5 timers lys om sommeren og 10,5 timer om vinteren. Brug et tænd-sluk-ur, og lad natten være helt mørk.

UVB er ikke nødvendigt, når foderet pudres med kalk og D3-vitamin, og *Goniurosaurus huuliensis* klarer sig med almindelig belysning. Et svagt UVB-lys kan dog være en fordel for tigergekkoer, fordi det kan styrke kalkomsætningen. Vælger du det, så brug et rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1), fx et T5-rør på 5-7 %, over en del af terrariet, så UV-indekset højst er omkring 1-2 på de øverste flader, og der altid er skygge og skjul.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

FODER

Tigergekkoer er rene insektædere. Giv fårekyllinger, dubia-kakerlakker og græshopper som grundfoder og en gang imellem melorme, voksmøllarver eller silkeormspupper. Byttet skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne, og alt pudres med kalk og et vitamin-mineralpræparat. Voksne dyr fodres to til tre gange om ugen. *Goniurosaurus huuliensis* fodres cirka to gange om ugen.

Ungerne får små fårekyllinger fra omkring tre dage efter klækningen og derefter hver anden dag eller tre gange om ugen de første måneder. En lille skål med kalk, som dyrene kan slikke af, er en god idé. Den skal skiftes ofte, fordi kalken suger fugt og mugner. Voksmøllarver og andre fede larver skal kun være en godbid, for voksne dyr bliver let for tykke.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Tigergekkoer er hemmelighedsfulde dyr, der tilbringer dagen i skjul og først kommer frem, når det er mørkt. De farer i dækning, hvis de bliver forskrækket, og er bedst at iagttage. Nogle dyr tåler at blive taget op, men det skal man ikke regne med. Hold håndteringen kort, tag aldrig fat i halen, og giv nye dyr et par uger i fred.

Arten kan holdes alene, i par eller som en han med to hunner, hvis der er plads og mange skjul. To hanner må aldrig gå sammen, fordi de slås. Unger kan en tid gå i små grupper af samme størrelse, men skal deles, før de bliver kønsmodne. Det er helt normalt, at gekkoen slikker øjne og mund ren med tungen, og som andre øjenlågsgekkoer spiser den sin afstødte hud.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannerne kendes på en række porer foran kloakken og den tydelige fortykkelse ved halens rod, hvor hemipenis-poserne sidder. Hos *Goniurosaurus huuliensis* kan kønnet ses fra omkring seks måneders alderen, og dyrene er kønsmodne ved omkring to år. Hvornår *Goniurosaurus luii* bliver kønsmoden, er ikke sikkert kendt. Der nævnes ned til 6-10 måneder, men det

er alt for tidligt til at sætte en hun i avl, og faktaboksen har derfor intet tal.

Vent, til hunnen er fuldt udvokset og i god foderstand, helst til hun er omkring to år. Æggene tærer på hendes kalkreserver, og for tidlig avl kan give kalkmangel og tabte æg. Brug kun dyr af kendt oprindelse, og kryds aldrig forskellige arter eller lokaliteter af tigergekkoer.

PARRING

Avlssæsonen begynder om foråret, når temperatur og luftfugtighed stiger. Forinden skal dyrene have en kølig vinter: to til tre måneder ved 18-22 °C med kortere dage og foder højst en gang om ugen. Derefter hæves temperaturen langsomt til 25-26 °C, og der fodres mere. Uden vinterpausen kommer mange tigergekkoer ikke i avlsstemning.

Sæt hannen til hunnen, og lad dem gå sammen, så længe der er ro. Arten kan også holdes fast i par eller trio. Tag hannen ud, hvis hunnen virker stresset eller taber sig, og giv hende pauser i løbet af sæsonen.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger næsten altid to bløde æg ad gangen, sjældnere kun ét, og graver dem ned i bunden. Det bliver til flere kuld i løbet af sæsonen. Hos *Goniurosaurus huuliensis* er et til tre kuld om året det typiske og fire muligt, og i fangenskab lægges de fleste æg mellem juni og september. For *Goniurosaurus luii* nævnes op til seks kuld, men faktaboksen holder sig til de bedre dokumenterede et til fire.

Stil en æglæggekasse med mindst 5 cm fugtig sphagnum, kokosfibre eller vermiculit i terrariet. Giv hunnen rigeligt med kalk og insekter hele sæsonen, og tag hannen ud og giv hende hvile, hvis hun taber sig.

INKUBATION

Flyt æggene forsigtigt til en lukket plastboks med let fugtig vermiculit og et par små lufthuller, og læg dem omkring en tredjedel ned i substratet. Marker oversiden, og vend dem ikke. Æggene inkuberes typisk ved 25-27 °C. Æg af *Goniurosaurus huuliensis* kan ligge ved terrarietemperatur, ca. 23,5-26 °C, og i inkubator anbefales 24-27 °C.

Tiden afhænger af temperaturen: ved 27 °C klækker æggene efter 45-50 dage og ved 25-26 °C efter 60-80 dage. Hos *Goniurosaurus huuliensis* er gennemsnittet 70-75 dage ved lidt lavere temperatur. Ved klækningen siver der væske ud af skallen, og ungen kan bruge flere timer på at komme ud. Om temperaturen bestemmer kønnet hos arten, er ikke kendt.

Læs mere: Inkubation af æg

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne skifter hud kort efter klækningen. Når det er overstået, flyttes de til en faunaboks på omkring 30 × 20 × 20 cm med kokosfibre, et fugtigt hjørne med sphagnum, et stykke kork og en lille vandskål. Køkkenrulle som bund de første uger gør det let at se, om ungen spiser og har normal afføring. To til tre unger kan gå sammen de første uger og flyttes siden til terrarier på 40 × 40 × 35 cm op til 60 × 50 × 40 cm. Spray dagligt.

Første måltid er små fårekyllinger efter omkring tre dage, derefter hver anden dag eller tre gange om ugen, altid pudret med kalk og vitaminer. Ungerne skifter farve, mens de vokser, og unger af forskellige tigergekkoer er næsten umulige at skelne, så hold styr på oprindelsen. Del dyrene, før de bliver kønsmodne, især hannerne.

Sundhed og typiske fejl

Tigergekkoer er hårdføre, når klimaet er rigtigt, og de fleste problemer skyldes forkert temperatur, fugt eller kalk. De typiske fejl er:

- For meget varme. Over 28 °C bliver dyrene stressede, og længere tid med høj varme kan slå dem ihjel.
- Tørre perioder. Er luften tør i længere tid, svækkes dyrene og kan dø. Spray dagligt, og giv et fugtigt skjul.
- Hudrester, der sidder fast på tæer og halespids, når luften er for tør. Et fugtigt skjul hjælper.
- Kalkmangel, især hos unger og hunner i avlssæsonen. Det giver bløde knogler, tabte æg og kan føre til æglægningsbesvær. Pudr alt foder med kalk og vitaminer.
- Mug og bakterier i en konstant våd bund uden dræn og ventilation.
- Parasitter. Regelmæssige afføringsprøver anbefales, og nye dyr bør stå i karantæne.

Advarselstegn er manglende appetit i flere uger, vægttab, en tynd hale og slap holdning. Kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret ikke spiser eller virker sygt.

Læs mere: Karantæne og hygiejne

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.