herpy

GEKKOER

Common house gecko

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus er en robust, nataktiv gekko fra Syd- og Sydøstasien, som har fulgt med skibe og last ud i hele troperne og i dag bor i husene i store dele af verden. Den klatrer på lodrette flader, jager insekter under lamper og kalder med et højt, tikkende klukken. I terrarier er den sjælden, og den er bedst kendt som en invasiv art.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**46-62 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten er hverken optaget i CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige papirer ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav om passende pasning gælder. Arten er invasiv mange steder i verden og truer lokale gekkoer. Slip aldrig dyr eller æg fri, og udveksl ikke dyr på tværs af grænser uden at tjekke lokale regler. I IUCN-opslaget står arten som ikke vurderet (NE).

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Hemidactylus frenatus* er sjældent beskrevet i fangenskab, så anbefalingerne her er en vurdering ud fra dens levevis og fra andre små, klatrende gekkoer.
TEMPERATUR	Der findes ingen gode, offentligt tilgængelige temperaturtal fra fangenskab, så tallene her bygger på artens levevis og på, at den selv regulerer sin kropstemperatur ved 26-35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold en luftfugtighed på omkring 50-70 %, og spray terrariet let en gang om dagen, helst om aftenen, så der er dug på blade og sten. Fugtigheden skal kunne falde i løbet af dagen.
LYS OG UVB	*Hemidactylus frenatus* er aktiv i skumringen og om natten, og der findes ingen dokumenteret UVB-anbefaling.
FODER	I naturen er *Hemidactylus frenatus* en alsidig jæger. Insekter og edderkopper udgør størstedelen af kosten: kakerlakker, termitter, fluer, møl, biller, bier og hveps.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hemidactylus frenatus* er hurtig, nervøs og skal ikke håndteres. Den kan bide, hvis den er stresset, men bidet er ret svagt og harmløst for mennesker.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien og Filippinerne.