herpy

GEKKOER

Carrot-tail viper gecko

Hemidactylus imbricatus

Hemidactylus imbricatus er en lille, stribet ørkengekko fra det sydlige Pakistan med en tyk, gulerodsformet hale, der er dens fedtlager. Den lever skjult på tør jord om dagen og jager om natten, kræver kun et lille terrarie og kan holdes sammen i par eller små grupper.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Teratolepis fasciata* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-25 °C**
Luftfugtighed	**40-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis, 1 han med flere hunner eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**10-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-80 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav om passende pasning. IUCN vurderer arten som ikke truet (LC), men oplysningerne om dens vilde bestande er sparsomme.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Til et par eller en han med to hunner rækker et terrarie på 40 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde). Målene kan også vendes, så terrariet er 30 cm langt og 40 cm dybt.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen i terrariet ligger på 25-30 °C. Angivelserne svinger fra 25-30 °C om sommeren til 24-29 °C med et varmt sted på omkring 35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Hemidactylus imbricatus* kommer fra et tørt område og klarer sig bedst med en forholdsvis lav luftfugtighed på omkring 40-50 %.
LYS OG UVB	*Hemidactylus imbricatus* er aktiv i skumringen og om natten og kræver ikke særligt lys. UVB er ikke nødvendigt. Giv i stedet dyrene kalk med D3-vitamin gennem foderet.
FODER	*Hemidactylus imbricatus* er insektæder. Giv voksne dyr levende insekter en til to gange om ugen: mellemstore fårekyllinger, små dubia-kakerlakker, voksmøllarver og enkelte hjemmefårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hemidactylus imbricatus* er stille og rolig og kan med tiden blive vant til håndtering, men den er et dyr, man kigger på.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Pakistan.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/hemidactylus-imbricatus