herpy

GEKKOER

Taylor's fat-tailed gecko

Hemitheconyx taylori

En rolig, jordlevende gekko fra de tørre egne i Somalia og Etiopien, med fløjlsblød hud, en kort, fed hale og øjenlåg. *Hemitheconyx taylori* er sjælden i terrarier og kræver mere varme end de fleste gekkoer fra samme familie.

Familie: Eublepharidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**29-32 °C**
Hotspot	**40 °C**
Temperatur, nat	**25-26 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**22-25 °C** 16-17 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**43-70 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyr er sjældne i handlen, og det er værd at spørge, om de er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par voksne dyr kan holdes i et terrarie på mindst 50 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre. Holder du flere end et par, skal der være ekstra plads og mange skjul.

TEMPERATUR

Hemitheconyx taylori skal have varmt: om dagen 29-32 °C i terrariet og et varmt sted lige under varmekilden på omkring 40 °C. Om natten holdes temperaturen på 25-26 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet skal ligge på 40-60 %. Der sprøjtes ikke, fordi arten kommer fra et tørt område; en vandskål med frisk vand giver fugt nok.

LYS OG UVB

Arten er nataktiv, og behovet for UVB er ikke dokumenteret, men et fuldspektrumrør over terrariet er almindeligt. I aktivitetsperioden er dagslængden 14 timer. Om vinteren, i hvileperioden, er lys ikke nødvendigt.

FODER

Hemitheconyx taylori lever udelukkende af insekter. Voksne dyr får kakerlakker, fårekyllinger og andre insekter, 2 gange om ugen, 4-5 stykker pr. dyr. Giv desuden 1-2 hvide zophobas-larver til hvert dyr en gang om ugen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hemitheconyx taylori er en fredelig gekko, men der er ikke dokumenteret meget om, hvordan den tåler at blive håndteret. Hannerne er territoriale, og to hanner skal ikke holdes sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Somalia og Etiopien.