herpy

GEKKOER

Taylor's fat-tailed gecko

Hemitheconyx taylori

En rolig, jordlevende gekko fra de tørre egne i Somalia og Etiopien, med fløjlsblød hud, en kort, fed hale og øjenlåg. *Hemitheconyx taylori* er sjælden i terrarier og kræver mere varme end de fleste gekkoer fra samme familie.

Familie: Eublepharidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**29-32 °C**
Hotspot	**40 °C**
Temperatur, nat	**25-26 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**22-25 °C** 16-17 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**43-70 dage** ved 28-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyr er sjældne i handlen, og det er værd at spørge, om de er opdrættet i fangenskab.

Om arten

Hemitheconyx taylori er en mellemstor gekko i familien Eublepharidae, hvis arter i modsætning til de fleste andre gekkoer har bevægelige øjenlåg. Huden er blød og fløjlsagtig, kroppen er kraftig, og halen er kort og tyk. Den bruges som fedtlager, så en velnæret gekko har en fyldig hale. Hovedet er afrundet i snuden, og ryggen er dækket af små korn med spredte, forstørrede, kølede skæl. Disse knopper er tydeligere end hos slægtningen *H. caudicinctus*.

Grundfarven er lysebrun, mørkere på snuden og siderne af hovedet, og undersiden er hvid. Brede, mørkere bånd løber på tværs over nakken, lænden, halens rod og midten af halen. Hannerne har 23-28 forstørrede porer foran kloakken, og de er territoriale.

Arten blev beskrevet i 1930 af Hampton Wildman Parker ud fra dyr fra det daværende Britisk Somaliland. Den bliver 11-14 cm fra snude til kloak; angivelserne af den største længde svinger mellem de to tal. Den er hverken så udbredt eller så godt kendt i terrarier som *H. caudicinctus*, og der findes kun få udførlige beskrivelser af, hvordan den holdes og formeres. Derfor bygger flere af tallene i denne vejledning på de få erfaringer, der findes, og på den nærmeste slægtning.

Udbredelse og levested

Hemitheconyx taylori lever i det nordøstlige Afrika, i det nordlige Somalia og det østlige Etiopien. Typelokaliteten er Hegligab-distriktet i det daværende Britisk Somaliland, i ca. 460 meters højde.

Det er uklart, hvor præcist udbredelsen går, og kortet her er derfor kun et grovt overslag. Fund langt uden for dette område kan stamme fra dyr i fangenskab eller fejlregistreringer.

> **Oprindelig udbredelse:** Somalia og Etiopien.

LEVESTED

Arten lever på tørre, åbne arealer med ørkenlignende landskab i ca. 640-1.250 meters højde. Den er nataktiv, lever på jorden og holder sig om dagen skjult i små huler under sten. Den er svær at få øje på i naturen. Føden består af langsomme insekter.

De varme dale, hvor arten forekommer, kan om dagen ligge på omkring 28-38 °C. Det er meget varmere end hos de fleste andre arter i familien, og derfor skal terrariet være varmt.

Pasning

TERRARIET

Et par voksne dyr kan holdes i et terrarie på mindst 50 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre. Holder du flere end et par, skal der være ekstra plads og mange skjul. Hanner er territoriale og skal ikke holdes sammen med hinanden.

Som bund fungerer ler til voksne dyr. Indret med stenskjul og bambusrør, en lav vandskål og et fugtigt skjul med mos eller fugtigt papir, som dyret kan bruge, når det skal skifte hud. Skjulene giver ro om dagen, og den lune side bør have et tørt skjul. Terrariet skal være tørt og opvarmet i den ene ende og køligere i den anden, så gekkoen selv kan vælge temperatur.

TEMPERATUR

Hemitheconyx taylori skal have varmt: om dagen 29-32 °C i terrariet og et varmt sted lige under varmekilden på omkring 40 °C. Om natten holdes temperaturen på 25-26 °C. Brug en spotlampe på ca. 40 W som varmekilde og et termometer, og sluk lampen, hvis temperaturen i terrariet bliver for høj.

Om vinteren kan arten få en hvileperiode på omkring fire måneder, fra november til februar. Så ligger temperaturen på 24-26 °C om dagen og 22-23 °C om natten, uden varmt sted. I februar hæves temperaturen igen til de normale værdier. Arten holdes varmere end de fleste andre arter i familien, så tjek altid, at den lune side virkelig når de 40 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden i terrariet skal ligge på 40-60 %. Der sprøjtes ikke, fordi arten kommer fra et tørt område; en vandskål med frisk vand giver fugt nok. Skift vandet jævnligt, og lad et fugtigt skjul være tilgængeligt hele tiden, så hudskiftet går let. Mos eller fugtigt papir i skjulet holder fugten uden at gøre resten af terrariet vådt. Mål luftfugtigheden med et hygrometer.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er nataktiv, og behovet for UVB er ikke dokumenteret, men et fuldspektrumrør over terrariet er almindeligt. I aktivitetsperioden er dagslængden 14 timer. Om vinteren, i hvileperioden, er lys ikke nødvendigt. Giv altid skygge i en del af terrariet, så gekkoen kan trække sig væk fra lyset.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Hemitheconyx taylori lever udelukkende af insekter. Voksne dyr får kakerlakker, fårekyllinger og andre insekter, 2 gange om ugen, 4-5 stykker pr. dyr. Giv desuden 1-2 hvide zophobas-larver til hvert dyr en gang om ugen. Under hvileperioden fodres der stadig 1-3 gange om ugen.

Pudr insekterne med kalk ved hver fodring, og giv et vitamintilskud, gerne med D3, en gang om ugen fra dyrene er ca. to måneder gamle. Kalk er særlig vigtig for unge dyr og æglæggende hunner. Unge dyr kan være svære at få til at spise (se Opdræt).

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hemitheconyx taylori er en fredelig gekko, men der er ikke dokumenteret meget om, hvordan den tåler at blive håndteret. Hannerne er territoriale, og to hanner skal ikke holdes sammen. Et par eller en enkelt gekko kan holdes uden problemer. Tag aldrig fat i halen, for den kan afkastes ved fare og vokser kun ud igen i en anden form. Nye dyr skal have lov til at falde til i ro i nogle uger.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannerne kendes på de forstørrede porer foran kloakken, som hos denne art tæller 23-28. Der er ikke dokumenteret en sikker alder eller vægt for avl hos arten. For den nære slægtning *H. caudicinctus* sættes hannerne i avl fra ca. 7 måneder og 40 g og hunnerne fra ca. 8 måneder og 45 g, men tallene er lånt og kan ikke uden videre overføres.

PARRING

Der er kun få dokumenterede erfaringer med parring af arten. En hvileperiode om vinteren, med lavere temperatur og uden lys, ser ud til at hjælpe, og avl begynder efter den, når temperaturen hæves igen. For *H. caudicinctus* er avlssæsonen fra oktober til maj, og en kort nedkøling på fire til seks uger fremmer parringen. Det er ikke dokumenteret for denne art. Sæt hannen til hunnen og hold øje med dem de første dage.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger formentlig to æg ad gangen, som hos slægtningen *H. caudicinctus*, hvor hunnen lægger tre til fem kuld om året. For *H. taylori* er antallet af kuld ikke dokumenteret. Giv hunnen en æglæggekasse med jævnt fugtigt substrat af tørv og vermiculit, væk fra varmekilden, så den ikke tørrer ud. Fodr hunnen rigeligt og giv kalk ved hver fodring i hele sæsonen.

INKUBATION

Der er ikke dokumenteret en inkubationstid for *Hemitheconyx taylori*. For *H. caudicinctus* klækker æggene efter 55-70 dage ved 28-29 °C og efter 43-48 dage ved 31-32 °C, og temperaturen afgør kønnet. Æggene er følsomme over for for meget vand. Brug jævnt fugtigt substrat af tørv og vermiculit, som ikke drypper, når det klemmes. Tallene her er lånt fra slægtningen og skal kun bruges som en rettesnor.

OPDRÆT AF UNGER

Det er svært at få ungerne af *Hemitheconyx taylori* til at spise, og det er den største udfordring ved opdrættet. Hold dem i et lille terrarie med papir som bund, de samme temperaturer og samme luftfugtighed som de voksne, og giv små insekter med kalk. Begynd at fodre et par dage efter klækningen. For *H. caudicinctus* flyttes ungerne til voksent terrarie ved ca. 15 g, men tallet er lånt.

Sundhed og typiske fejl

Hemitheconyx taylori er så sjælden i terrarier, at der kun findes få erfaringer med sygdomme. De mest almindelige problemer i pasningen er:

- Unge dyr, der ikke vil spise. Hold dem varme og giv små, bevægelige insekter.
- Kalkmangel, især hos unge dyr og æglæggende hunner. Pudr insekterne med kalk og giv jævnligt et vitamintilskud.
- For lav temperatur. Arten kommer fra et varmt område og trives ikke i et køligt terrarie.
- Hudrester, der sidder fast. Giv et fugtigt skjul, så hudskiftet går let.

Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis gekkoen taber sig, holder op med at spise i flere uger eller virker slap.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.