herpy

GEKKOER

Reticulated velvet gecko

Hesperoedura reticulata

Hesperoedura reticulata er en lille, nataktiv træboende gekko fra Western Australias indre sydvest, hvor den lever under løs bark på eukalyptustræer i åben skov og krat. Den er næsten ukendt i terrariet, så pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på slægtninge i samme familie.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Oedura reticulata; Amalosia reticulata*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Halvørken og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**28-32 °C**
Temperatur, nat	**15-18 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Vinterhvile	**10-15 °C** 6-10 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-80 dage** ved 25-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun meget lidt viden om pasningen af *Hesperoedura reticulata*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-28 °C i terrariet, og et lille varmt sted under en lampe eller på en sten må nå 28-32 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være forholdsvis tør, omkring 30-50 %. Spray let på bark og blade om aftenen 1-2 gange om ugen, så dyret kan drikke af dråberne, og lad indretningen tørre ud igen i løbet af en dag. Bunden skal være tør.
LYS OG UVB	*Hesperoedura reticulata* er nataktiv og lever skjult om dagen, så den har ikke et stort behov for UVB.
FODER	*Hesperoedura reticulata* lever af insekter og andre små leddyr. I terrariet fungerer fårekyllinger, små græshopper, kakerlakker og møl. Byttet må ikke være bredere end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hesperoedura reticulata* er skyg og hurtig og bedst som et dyr at se på, ikke et dyr, der skal håndteres. Den er nataktiv og viser sig først, når lyset er slukket.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/hesperoedura-reticulata