herpy

GEKKOER

African whole-toed gecko

Holodactylus africanus

En lille, nataktiv jordgekko fra de tørre egne i det østlige Afrika med store øjne og bevægelige øjenlåg, lange klør på tæerne og en tyk, kort hale, hvor den lagrer fedt. Den graver sine egne skjul og lever især af termitter. Arten er sjælden i terrarier, og der findes kun få beskrevne pasningserfaringer.

Familie: Eublepharidae Tidligere navn: *Holodactylus aculeatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-11 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Hotspot	**33-35 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**45-60 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført under CITES og står ikke på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der er kun få angivelser af terrariestørrelse for arten. Til ét dyr nævnes et terrarie på omkring 45 × 45 cm i grundflade, og til en lille avlsgruppe med en han og to hunner mindst 90 cm i længden.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 27-30 °C i terrariet med et varmt sted på omkring 33-35 °C under en lav varmelampe i den ene ende. I den anden ende skal der være køligere, så dyret selv kan vælge.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden i selve terrariet skal være lav, omkring 30-40 % om dagen, så bunden er tør i overfladen. Fugten kommer i stedet fra det fugtige skjul, hvor dyret kan hvile og skifte hud.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og skjuler sig det meste af dagen. En fast døgnrytme med omkring 12-14 timers lys om sommeren og 10-12 timer om vinteren er en god ramme. Tallene er lånt fra beslægtede arter.
FODER	I naturen lever *Holodactylus africanus* hovedsageligt af termitter, suppleret med biller, edderkopper og andre små leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Det er en rolig, men bidsk art, der helst vil være i fred. Bidet kan være kraftigt, og dyret kan holde fast. Det er ikke farligt, men det gør ondt, og såret skal vaskes.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Etiopien, Kenya, Somalia og Tanzania.