herpy

GEKKOER

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

En kraftig, fløjlsblød gekko fra Østafrikas savanner med mørke bånd over ryggen og både hæftelameller og kløer på tæerne. Den er mest aktiv om natten, gemmer sig i huller i store træer og spiller død, når den bliver truet. Pasningen er kun beskrevet i grove træk.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-11 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**28-32 °C**
Temperatur, nat	**19-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**19-23 °C** 12-16 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**4-5**
Inkubation	**60-80 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø eller Fødevarestyrelsen, hvis du er i tvivl om de aktuelle regler.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par kan klare sig i et terrarie på omkring 50 × 25 × 30 cm, men et højere terrarie er bedre, fordi *H. fasciata* klatrer.

TEMPERATUR
Om dagen skal temperaturen ligge på 24-28 °C, og der skal være et varmere sted på 28-32 °C, fx under en lille halogenpære på 10-20 W eller over en varmemåtte. Om natten må den falde 3-6 °C, til omkring 19-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være moderat til høj, 60-80 %, med en gradient fra den ene ende af terrariet til den anden. Det klares ved at stille vandskålen i den kølige ende og sprøjte det område, så den anden ende holdes lidt tørrere.

LYS OG UVB
Arten er aktiv i skumringen og om natten og kan ses i dagslys, men skjuler sig i skyggen midt på dagen. Brug almindeligt plantelys på et tænd-sluk-ur, 12 timer tændt og 12 timer slukket.

FODER
Hovedfoderet er fårekyllinger, suppleret med kakerlakker, melorme og andre insekter i passende størrelse, så kosten bliver varieret. Voksmøllarver kan gives en gang imellem. Insekterne skal kunne sluges uden besvær.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Homopholis fasciata kan bide og holde fast, og den spiller død og bliver ofte liggende ubevægelig, når den er bange, så tag den ikke op uden grund. Giv nye dyr tid til at falde til.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Etiopien, Kenya, Somalia og Tanzania.