herpy

GEKKOER

Duvaucel's gecko

Hoplodactylus duvaucelii

Hoplodactylus duvaucelii er New Zealands største nulevende gekko: tung, olivengrå og nataktiv. Den kan blive over 40 år gammel, får én eller to levende unger ad gangen og er først kønsmoden efter omkring syv år. I dag lever den kun på rovdyrfri øer, og den er en art for specialister, ikke for hobbyen.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Platydactylus duvaucelii; Woodworthia duvaucelii; Naultinus duvauceli* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-32 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**45-120 g**
Levetid	**40-50 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende, klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 120 × 100 cm** L × B × H til 5 voksne dyr
Temperatur, dag	**15-25 °C**
Hotspot	**25-30 °C**
Temperatur, nat	**10-16 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og nektar**
Holdes	**1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**72-84 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**150-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Slægten Hoplodactylus står samlet på CITES liste III (opført af New Zealand) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr, så handel og indførsel kræver dokumentation. Der er ingen kendt almindelig handel med opdrættede dyr; dyr i fangenskab findes især i forsknings- og udsætningsprogrammer. Kontakt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du overvejer at anskaffe arten.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes ingen almindelig hobbypasning af *Hoplodactylus duvaucelii*.
TEMPERATUR	Arten er tilpasset et tempereret, oceanisk klima og er aktiv året rundt. Newzealandske firben skal have en omgivelsestemperatur på 5-25 °C året rundt, omkring 15-25 °C om sommeren og køligere om vinteren.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	For newzealandske firben er 60-70 % luftfugtighed ideelt, så længe dyrene kan opsøge fugtigere steder.
LYS OG UVB	Dyrene er nataktive, men soler sig skjult i løbet af dagen. Også nataktive newzealandske gekkoer skal have naturligt lys med UVA og UVB: Udendørs indhegninger med net giver det fra solen, og unger skal have lys i en 12:12-rytme.
FODER	Giv levende insekter eller insektlarver og en frugtpuré med tilsat vitamin- og mineralpræparater, to gange om ugen om sommeren og én gang om ugen om vinteren.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Hoplodactylus duvaucelii* er rolig og tolerant over for artsfæller og viser ikke tegn på kronisk stress i fangenskab.
OPRINDELIG UDBREDELSE	New Zealand.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/hoplodactylus-duvaucelii