herpy

GEKKOER

Box-patterned gecko

Lucasium steindachneri

Lucasium steindachneri er en lille, jordlevende gekko fra det indre af det østlige Australien med en lys stribe ned ad ryggen, brudt af mørkebrune felter. Den er nataktiv, lever af små leddyr og er nem at passe i et lille, tørt terrarie, men den er sjælden uden for Australien.

Familie: Diplodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 25 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**56-75 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97. Der kræves derfor ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. Australien tillader stort set ikke eksport af sine vilde dyr, så dyr uden for landet stammer fra gamle opdrætsbestande og er meget sjældne i handlen. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav, og dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Lucasium steindachneri* er den samme som for de jordlevende australske gekkoer i slægten *Diplodactylus*, som arten tidligere blev regnet til, og som for *Lucasium damaeum*.

TEMPERATUR

En varmemåtte eller varmetape under den ene ende, styret af en termostat, skal give 28-30 °C på en del af bunden om sommeren. Resten holdes på 22-26 °C om dagen. Om natten kan varmen slukkes, så temperaturen falder til 16-20 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Lucasium steindachneri skal ikke have høj luftfugtighed. Almindelig stueluft med 30-50 % er nok. Et af skjulene fyldes med let fugtig sphagnum eller fugtigt sand, så dyret kan skifte hud.

LYS OG UVB

Lucasium steindachneri er nataktiv og har ikke brug for UVB eller anden særlig belysning, så UVB er valgfrit.

FODER

I naturen æder *Lucasium steindachneri* forskellige leddyr som insekter, edderkopper og skorpioner. I terrariet tager den fårekyllinger, kakerlakker, termitter, fluer, møl og voksmøllarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lucasium steindachneri er stille og tilbagetrukket. Om dagen sover den i sit skjul og bliver aktiv, når mørket falder på. Håndtering er unødvendig og bør være sjælden og kort; et forskrækket dyr kan hvæse og springe frem.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.