herpy

GEKKOER

Common dwarf gecko

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis er en lille, gråbrun dværggekko fra det sydlige og østlige Afrika, hvor den lever på træer i savanne og åben skov og ofte på husmure. Den er dagaktiv, bliver 7-9 cm inklusive hale og vejer under 1 g. Arten er slægtens typeart og almindelig i naturen, men holdes sjældent.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**0,7-1,1 g**
Levetid	**4-6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-75 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-15 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav om passende bolig, foder og pleje gælder. Tjek altid de gældende regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du indfører dyr fra lande uden for EU.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lygodactylus capensis*. Klimaet i udbredelsesområdet er varmt med regn om sommeren og en tør, køligere vinter, og arten lever på træer i savanne og åben skov.

TEMPERATUR

Om dagen skal baggrundstemperaturen ligge på 25-30 °C med en solplet på 30-35 °C under en lille spot. Varmelampen behøver ikke være tændt hele dagen: to til fire perioder på 30-45 minutter om sommeren og to om vinteren er nok.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden holdes på 50-60 % om dagen og 60-75 % om natten. Sprøjt let hver morgen, så blade og vægge får dråber, og lad terrariet tørre op i løbet af dagen.

LYS OG UVB

Lygodactylus capensis sidder ofte i fuld sol og har brug for kraftigt, jævnt lys. Brug T5-lysstofrør eller LED med dagslys, og kombinér med et UVB-rør. UVB-styrken er ikke dokumenteret for arten.

FODER

Myrer udgør 30-50 % af føden i naturen. I terrariet består kosten af små levende foderdyr: små fårekyllinger, bananfluer, springhaler, bønnebiller, små isopoder og små kakerlakker.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lygodactylus capensis er hurtig og kan let slippe væk eller blive skadet, og halen smides let, så arten egner sig ikke til håndtering. Åbn kun lågerne kortvarigt, og hold øje med spalter, hvor dyrene kan slippe ud.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sydafrika, Eswatini, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Malawi, Congo-Kinshasa, Tanzania og Kenya.