herpy

GEKKOER

Okavango dwarf gecko

Lygodactylus chobiensis

En af de største dværggekkoer i slægten, op til 44 mm fra snude til kloak. *Lygodactylus chobiensis* er blågrå med store lyse pletter og gul bug, lever på træer i savannen langs Chobe- og Zambezifloderne og kan holdes i et lille, højt og tæt terrarie.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Lygodactylus picturatus chobiensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-65 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**125 dage** ved 24-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Lygodactylus chobiensis*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus chobiensis* er et varmeelskende dagdyr, og terrariet skal have en tydelig temperaturforskel.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på omkring 40-65 %, lidt lavere end til *Lygodactylus picturatus*, fordi levestedet har en lang tørtid. Tallet er et skøn.
LYS OG UVB	*Lygodactylus chobiensis* er dagaktiv og har brug for kraftigt, jævnt lys. Brug lysstofrør, helst T5, og kombinér et UVB-rør med et dagslysrør, så terrariet bliver lyst.
FODER	I naturen lever *Lygodactylus chobiensis* mest af myrer og termitter. I terrariet skal den have levende smådyr: springhaler, bananfluer, små fårekyllinger, nyklækkede bønnebiller, små kakerlakker og små græshopper.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Lygodactylus chobiensis* er lille og hurtig. Som andre dagaktive dværggekkoer sidder den ofte ubevægelig på en gren og skyder så af sted efter et foderdyr.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambique og Malawi.