herpy

GEKKOER

Cameroon dwarf gecko

Lygodactylus conraui

En lille, dagaktiv klatrer fra de vestafrikanske skove, og den eneste grønne gekko i regionen. Den sidder på træstammer, palmeblade og husmure i skyggefulde skovkanter. Den er sjælden i terrarier, og pasningen bygger på nært beslægtede dværgdaggekkoer.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**32-34 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, nektar og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**4-8 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**60-120 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-bilagene og står ikke i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du er i tvivl om reglerne for indførsel fra lande uden for EU.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Lygodactylus conraui* bygger på den nært beslægtede *Lygodactylus williamsi* og på artens levevis i naturen.

TEMPERATUR

L. conraui bor i det varme, fugtige lavland. Om dagen skal der være 24-27 °C med en solplet på 32-34 °C, som dyret kan søge til og forlade igen. Øverst i terrariet må der gerne være 27-29 °C og forneden 24-27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 %, højest forneden. Sprøjt planter, sider og bund to til tre gange om dagen i omkring et minut, og lad dråberne fordampe og det øverste lag af bunden tørre lidt, før du sprøjter igen.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og skal have kraftigt, fuldspektret lys. Brug lysstofrør af typen T5, ét med dagslys på omkring 6500 K og ét med UVB.

FODER

I naturen lever arten af meget små leddyr, især små sommerfugle og termitter. I terrariet skal foderet være lige så småt: bananfluer, nyklækkede fårekyllinger, små voksmøllarver, springhaler og små bænkebidere, ikke over 6 mm.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Lygodactylus conraui er et dyr til at se på, ikke til at tage i hånden. Dværggekkoer er små, hurtige og skrøbelige, og håndtering stresser dem og kan koste halen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun og Ækvatorialguinea.