herpy

GEKKOER

Kim Howell's dwarf gecko

Lygodactylus kimhowelli

Lygodactylus kimhowelli er en lille, dagaktiv klatrer fra kystskovene i det nordøstlige Tanzania. Den har gult hoved, blågrå krop og sorte længdestriber, og den vil have sol, varme og et højt terrarie med bromelier og kork. Den passer til den, der har lidt erfaring og vil se et levende, territorielt dyr i dagslys.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**50-85 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**14-18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**75-100 dage** ved 25-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav til pasning og hold af dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par af *Lygodactylus kimhowelli* skal have et terrarie på mindst 40 × 40 × 40 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre, fordi arten er et af de større medlemmer af slægten og lever oppe i træerne.

TEMPERATUR
Angivelserne for *Lygodactylus kimhowelli* svinger. Om dagen nævnes alt fra 24-28 °C året rundt til 27-31 °C om sommeren og 25-29 °C om vinteren.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Sprøjt terrariet til *Lygodactylus kimhowelli* en til to gange om dagen, helst på planterne, så luftfugtigheden om dagen er omkring 50-70 % og stiger til 70-85 % om natten.

LYS OG UVB
Lygodactylus kimhowelli er dagaktiv og elsker sol, så der må ikke spares på lyset. Brug fx to T5-rør med dagslysspektrum, helst med UVA- og UVB-andel, og en halogenspot som varmepunkt.

FODER
Lygodactylus kimhowelli skal have levende bytte i en størrelse, den kan klare: små fårekyllinger, græshopper, fluer, bønnebiller, voksmøllarver, ovnfisk, bænkebidere, bladlus, kakerlakker og springhaler.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Lygodactylus kimhowelli er territorial og kan være stresset af for mange dyr på for lidt plads. Hanner må aldrig holdes sammen, fordi de er meget territoriale.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Tanzania.