herpy

GEKKOER

Mossy New Caledonian gecko

Mniarogekko chahoua

En stor, mosplettet og nataktiv klatrer fra de fugtige lavlandsskove på Ny Kaledonien, med en kort, bred snude og en kraftig gribehale. Den er en af de smukkeste blandt de store nykaledonske gekkoer, men kræver mere plads og mere tålmodighed end sin berømte slægtning *Correlophus ciliatus*.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Rhacodactylus chahoua; Platydactylus chahoua* Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-31 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**50-60 g**
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**15-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**3-5**
Inkubation	**60-120 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. I Ny Kaledonien er arten fredet i både Nordprovinsen og Sydprovinsen, så dyr i handlen bør være opdrættet i fangenskab. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Højden er vigtigere end bundarealet.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 22-26 °C i terrariet, og en liggeplads øverst under en svag varmepære må nå 27-29 °C. Angivelserne for liggepladsen svinger lidt, så hold dig gerne i den lave ende. Om natten er 18-22 °C passende.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Hold en luftfugtighed på 60-80 %, målt midt i terrariet, og lad den være højest om natten. Sprøjt grundigt med lunkent vand hver aften og om morgenen efter behov.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og kan overleve uden UVB, når den får D3-vitamin gennem foderet, men den trives bedst med svagt UVB-lys.

FODER
Mniarogekko chahoua er altædende. Grundfoderet er færdigblandet pulverkost til frugtædende gekkoer, rørt op med vand til en tyk grød og serveret på en hylde højt oppe, suppleret med levende insekter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Mniarogekko chahoua er sky og springsk som ung og bliver ofte roligere med alderen. Den har et kraftigt bid og et fast greb. Giv nye dyr to uger i fred, før du begynder at håndtere dem.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Ny Kaledonien.