herpy

GEKKOER

Mniarogekko jalu

Mniarogekko jalu er en stor, nataktiv og træboende gekko fra det yderste nord af Ny Kaledonien og Belep-øerne, nær beslægtet med *Mniarogekko chahoua*. Arten blev først beskrevet i 2012, er truet og kendes kun sparsomt, også i terrariet.

Familie: Diplodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Inkubation	**65-120 dage** ved 22-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Om arten

Mniarogekko jalu er en stor diplodactylid gekko, der måler op til 14 cm fra snude til kloak. Den er søsterart til *Mniarogekko chahoua* og ligner den, men hannerne har langt færre porer foran kloakken. Halens længde og dyrets vægt er ikke dokumenteret; hos *M. chahoua* er den samlede længde 25-31 cm.

Arten blev beskrevet i 2012 af Aaron Bauer, Anthony Whitaker, Ross Sadlier og Todd Jackman, da de store nykaledonske gekkoer blev revideret. Før da blev dyrene regnet med til *M. chahoua*. Artsnavnet kommer af *jâlu*, der betyder ånd, et væsen fra åndeverdenen, i sproget nyêlâyu, som tales i det nordlige Ny Kaledonien. Navnet svarer dermed til *chahoua*, der betyder "djævel" i et kanaksprog. I hele Ny Kaledonien forbindes de store gekkoer med åndeverdenen.

Der findes meget lidt viden om arten, og den holdes næppe i terrarier. Ungernes størrelse, kønsforskelle ud over porerne og levetiden er ikke dokumenteret. Hos de nære slægtninge *Mniarogekko chahoua* og *Correlophus ciliatus* lever dyrene 15-20 år.

Udbredelse og levested

Arten lever kun i Ny Kaledonien, i det yderste nord af Nordprovinsen: fra Diahot-floden på hovedøen Grande Terre til Île Art i Belep-øerne. Typelokaliteten ligger på Île Art, 230 meter over havet. På hovedøen er arten fundet nord og nordvest for Koumac, bl.a. ved Néhoué-floden, i Forêt d'Ougne og på Tiébaghi-massivet, fra havniveau til omkring 360 meters højde.

Udbredelsen er lille og ligger nord for udbredelsen af *Mniarogekko chahoua*. Arten kendes fra fire lokaliteter. Det samlede område, den forekommer i, anslås til omkring 1.340 km², men den bebor kun omkring 24 km² af det.

> **Oprindelig udbredelse:** Ny Kaledonien.

LEVESTED

Mniarogekko jalu lever tilsyneladende kun i træerne, i gammel, lukket skov med store kronetræer. Om natten søger den føde blandt kvistene og det yderste løv i kronerne eller på stammerne i de øvre lag af skoven. Om dagen gemmer den sig i sprækker og huller i grene og stammer og går ofte helt ned nær skovbunden for at finde et skjulested. Fundene ligger fra kysten til omkring 360 meters højde i et tropisk område med en fugtig og en tørrere tid på året.

Arten er truet (EN). Truslerne er skovbrande, tab af skov ved nikkelminedrift på Tiébaghi-massivet, den invasive myre *Wasmannia auropunctata*, vildkatte og ulovlig indsamling.

Pasning

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Mniarogekko jalu*. Tallene her er lånt fra *Mniarogekko chahoua*, der er en nær slægtning af samme størrelse og med samme levevis. Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde); større er bedre, og højden er vigtigere end bundarealet.

Indret med lodrette og skrå grene, korkrør, magnetiske hylder og planter i flere højder. Giv solide, vandrette siddepladser og skjul højt oppe, men også sprækker og korkrør længere nede, da arten i naturen ofte søger ned mod skovbunden for at sove. Som bund fungerer en fugtig blanding af jord uden gødning og kokosmuld med et lag visne blade ovenpå. Til unger er køkkenrulle det sikreste. God ventilation er vigtig.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 22-26 °C i det meste af terrariet, og der skal være en liggeplads på 27-29 °C under en svag lampe højt oppe. Om natten skal temperaturen falde til 18-22 °C. Over 29-30 °C er for varmt, så lad al opvarmning styre af en termostat. Mål temperaturen ved grenen under lampen med et digitalt termometer, og sørg for grene og skjul i alle højder, så dyret selv kan vælge.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Hold luftfugtigheden på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den skal stige om natten og falde i løbet af dagen, men aldrig komme under 50 %. Sprøjt terrariet grundigt hver aften, så dyret kan drikke dråber fra bladene, og stil en skål med frisk vand. Terrariet skal kunne tørre op mellem sprøjtningerne.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er nataktiv. Som hos *Mniarogekko chahoua* er svagt UVB-lys en fordel: et rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1), så UV-indekset er 1-2 på de øverste grene, og skygge i resten af terrariet. Hold lyset tændt 10-12 timer i døgnet, styret af et tænd-sluk-ur, og lad natten være mørk.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Kosten er lånt fra *Mniarogekko chahoua*, der æder både frugt og insekter. Giv en færdigblanding til frugtædende gekkoer, rørt op til en tyk grød, i en skål på en væghængt hylde, og skift mellem flere smagsvarianter. Hertil kommer levende insekter som fårekyllinger, kakerlakker, græshopper og silkeorme, der ikke må være længere end afstanden mellem dyrets øjne. Voksne dyr får grød 2-3 gange om ugen og insekter 1-2 gange om ugen. Pudr insekterne med kalk.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Adfærden er ikke beskrevet for *Mniarogekko jalu*. *Mniarogekko chahoua* er sky og springsk som ung, bliver ofte roligere med alderen og har et kraftigt bid. Lad et nyt dyr få to uger i fred, og håndtér det først, når det spiser. Hold sessionerne korte, og tag aldrig fat i halen, for den kan afkastes.

Dyret holdes bedst alene. Om en han kan gå sammen med hunner, er ikke dokumenteret; hos *M. chahoua* kan en han holdes med flere hunner, men to hanner må aldrig gå sammen.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder og vægt ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret for *Mniarogekko jalu*. Hannerne har en række porer foran kloakken, men langt færre end hos *Mniarogekko chahoua*. Dyrene bør være fuldt udvoksede, før de sættes i avl.

PARRING

Parringen er ikke beskrevet. Hos *Mniarogekko chahoua* hjælper en køligere periode på et par måneder med kortere dage dyrene i gang, hvorefter temperatur og dagslængde hæves igen. Om det samme gælder for *M. jalu*, er ikke dokumenteret.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten er æglæggende. Antal æg og kuld pr. år er ikke dokumenteret. *Mniarogekko chahoua* lægger to æg ad gangen. Giv hunnen en æglæggekasse med mindst 10 cm fugtigt substrat, så hun kan grave.

INKUBATION

Inkubationen er ikke beskrevet for *Mniarogekko jalu*. Tallene er lånt fra *Mniarogekko chahoua*: æggene ligger i fugtig vermiculite eller perlite ved 22-26 °C og klækker efter 65-120 dage. Over 28 °C er risikabelt. Om kønnet afhænger af temperaturen, vides ikke.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af unger er ikke dokumenteret. Hos *Mniarogekko chahoua* holdes ungerne i små bokse med køkkenrulle uden varmelampe og UVB og får daglig sprøjtning, færdigfoder og små insekter, indtil de er store nok til et højt terrarie.

Sundhed og typiske fejl

Der findes ikke sundhedsdata for *Mniarogekko jalu*. Typiske problemer hos de store nykaledonske gekkoer skyldes pasningen:

- Vedvarende for høj eller for lav luftfugtighed, som giver hud- og åndedrætsproblemer.
- For meget varme. Hold temperaturen under 29-30 °C.
- Mangel på kalk og D3-vitamin. Pudr insekterne med kalk.
- Tab af halen. Tag aldrig fat i halen.

Søg en dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig, ikke spiser i flere uger eller virker slapt.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.