herpy

GEKKOER

Eastern prickly knob-tailed gecko

Nephrurus asper

Nephrurus asper er en tætbygget, tornet knophalegekko fra det østlige og nordlige Queensland med ru, knoppet hud og en kort hale, der ender i en rund knop. Den er nataktiv, lever af insekter og hører til de få gekkoer, der ikke kan smide halen.

Familie: Carphodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-12 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**65-100 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Nephrurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Køb kun opdrættede dyr med kendt oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Nephrurus asper*. Tallene her er lånt fra *Nephrurus amyae*, der er den nærmeste og bedst kendte slægtning med samme levevis.
TEMPERATUR	Hold baggrunden på 24-28 °C om dagen og et varmt sted i den ene ende på 30-32 °C. Om natten falder temperaturen til 20-23 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten kommer fra et klima med en lang tørtid og holdes tørt ved en luftfugtighed på 30-50 %. Sprøjt toppen af skjulet en eller to gange om ugen, så gekkoen kan slikke vand af overfladen. En vandskål er ikke nødvendig.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. UVB er valgfrit; et svagt UVB-lys over en del af terrariet kan bruges, når der er rigeligt med skjul, så dyret altid kan trække sig væk fra det.
FODER	Arten lever af insekter og andre små leddyr. Giv fårekyllinger, små kakerlakker og græshopper som grundfoder og af og til soldaterfluelarver, voksmøllarver eller melorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er roligt og tåler korte håndteringer, men det er et dyr at se på snarere end at have på hånden. Hold seancerne korte og tæt over bunden, og tag det ikke op om dagen, hvor det sover.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/nephrurus-asper