herpy

GEKKOER

Wheeler's knob-tailed gecko

Nephrurus wheeleri

En lille, kraftigt bygget jordgekko fra det tørre indre af Vestaustralien med rødbrun krop, lyse tværbånd og en hale, der ender i en rund knop. Den er nataktiv, lever af insekter og skal have et tørt sandterrarie med et fugtigt skjul. En spændende art til den, der vil videre fra *Eublepharis macularius*.

Familie: Carphodactylidae Tidligere navn: *Nephrurus wheeleri wheeleri* Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**15-22 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**2-6**
Inkubation	**60-90 dage** ved 29-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Nephrurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien har strenge regler mod udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdræt fra ældre fangenskabslinjer. Spørg opdrætteren om afstamning.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr kan holdes i et terrarie på omkring 60 × 45 × 30 cm (længde × bredde × højde). Højden betyder ikke meget for en jordlevende art, bundarealet gør.

TEMPERATUR
Arten skal have en tydelig forskel mellem varm og kølig ende. Hold baggrunden på 22-27 °C om dagen og et varmt sted i den ene ende på 30-35 °C. Om natten må temperaturen falde til 15-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kommer fra tørre egne og skal holdes tørt ved en luftfugtighed på 30-40 %. Sprøjt en eller to gange om ugen, ikke mere, og sørg for så god ventilation, at overfladerne er tørre igen efter nogle timer.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. Lamper ovenfra kan stresse dyret, men et svagt UVB-lys, højst svarende til Ferguson-zone 1, over en del af terrariet kan bruges, når der er rigeligt med skjul. UVB er valgfrit.

FODER
Arten lever udelukkende af insekter og andre små leddyr. Giv fårekyllinger eller små kakerlakker som grundfoder og en gang imellem soldaterfluelarver, melorme eller voksmøllarver som godbid.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyret er roligt og tåler korte håndteringer, men det bliver sjældent så tamt som *Eublepharis macularius*, og for meget håndtering stresser det. Hold seancerne korte og tæt over bunden, og tag det ikke op om dagen, hvor det sover.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.