herpy

GEKKOER

Northern velvet gecko

Oedura castelnaui

Oedura castelnaui er en fladtrykt, nataktiv klatrer fra åben skov og savanne i det nordlige Queensland, især på Cape York-halvøen. Den lever skjult om dagen og kommer frem, når mørket falder på. Pasning og avl bygger i høj grad på erfaringer med slægtens andre arter.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Phyllodactylus castelnaui; Oedura mayeri* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**60-75 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne (slægten Oedura er ikke blandt de australske slægter på CITES liste III) og ikke i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller indførsel. IUCN vurderer arten som ikke truet (LC). Australien forbyder udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om opdrætsbevis. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et enkelt voksent dyr af *Oedura castelnaui* skal have et højt terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Et par har brug for noget mere, fx 60 × 45 × 60 cm.
TEMPERATUR	Hold dagtemperaturen på 24-28 °C og lad et lille område nå 30-32 °C, fx under en lav lampe eller en varmemåtte på siden. Om natten må temperaturen falde til 20-24 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold luften på omkring 40-60 % med en kortvarig stigning til op mod 70 % efter sprøjtning om aftenen. Lad terrariet tørre op i løbet af dagen. Stil altid en lav skål med frisk vand i terrariet, og skift den hver dag.
LYS OG UVB	*Oedura castelnaui* er nataktiv, og UVB er ikke nødvendigt. Et svagt UVB-lys er alligevel et rimeligt valg, så længe der også er skygge.
FODER	*Oedura castelnaui* lever af insekter. Giv levende foderdyr af passende størrelse: fårekyllinger, dubia-kakerlakker, græshopper og af og til melorme eller voksmøllarver. Insekterne skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Som andre *Oedura*-arter er *Oedura castelnaui* formentlig rolig, men skjult og hurtig, og den vrider sig hurtigt fri, hvis man tager fat. Tag den ikke op oftere end nødvendigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.